

# HEMATOMA INTRAMURAL COLONICO ESPONTANEO EN PACIENTE HEMOFILICO

Servicio de Diagnóstico por  
Imágenes. Hospital César  
Milstein, 2019

Autores:  
Serna S;  
Pappalardo F;  
Pérez F;  
Alarcón R;  
Moreno FL;  
González Toranzo RS;  
Zuk CA..

## Presentación del caso

El hematoma intramural colónico es una entidad poco habitual, que puede ser secundario a traumatismo, o de origen espontáneo (alteraciones hematológicas o terapias anticoagulantes). Su localización más frecuente es en el intestino delgado (yeyuno).


Los hallazgos clínicos comprenden dolor abdominal, náuseas, hemorragia digestiva, obstrucción intestinal y en casos más severos, hemoperitoneo por perforación del asa comprometida.

El propósito de este trabajo es reportar el caso de un paciente masculino de 62 años de edad, que consultó a la guardia externa de nuestra institución por cuadro clínico de una semana de evolución caracterizado por distensión abdominal, diarrea, vómitos y dolor abdominal difuso. Como antecedentes clínicos de relevancia presentaba hemofilia A, hipertensión arterial, diabetes mellitus insulino requiriente, hepatitis B y C y tabaquista.


## Hallazgos imagenológicos

Debido a su sintomatología, se solicitó ecografía abdominal donde se observó engrosamiento parietal concéntrico del colon ascendente de aproximadamente 14 mm. Por los hallazgos mencionados, se realizó tomografía de abdomen y pelvis con y sin contraste endovenoso, confirmando el engrosamiento parietal con áreas de mayor densidad (en la fase sin contraste), edema submucoso y presencia de ganglios locorregionales reactivos, sugestivo de proceso inflamatorio.


349



-Hospital Dr. César Milstein-



-Hospital Dr. César Milstein-



## Discusión

El diagnóstico es clínico y radiológico (ecografía y TC), donde se observa engrosamiento mural concéntrico espontáneamente denso. El tratamiento en general es conservador salvo casos de complicación donde se realiza hemicolectomía cuando existe riesgo de ruptura inminente.

## Conclusión

Para concluir, podemos decir que el hematoma intramural colónico espontáneo es una entidad de presentación poco usual, y más aún cuando la causa es hematológica como en nuestro caso. El manejo conservador es la primera elección de tratamiento en los casos no complicados.