

# Flebectasia de vena yugular externa. Reporte de un caso.



Servicio de Diagnóstico por  
Imágenes Hospital Dr. César  
Milstein, Buenos Aires,  
Argentina.

Pappalardo F; Vieytes M; D' abbraccio M;  
Fabrizio L; Serna S; Gonzalez M.

## Presentación del caso

La flebectasia de la vena yugular externa es una patología extremadamente rara en adultos. Se observa con mayor frecuencia en población pediátrica, con predominio en la vena yugular interna del lado derecho. Su etiología aun es desconocida.

Se presenta como una dilatación congénita, fusiforme y sin tortuosidad del vaso. La misma suele ser asintomática y manifestarse como una tumoración cervical blanda que varía ante las maniobras de valsalva. Sus complicaciones son trombosis y ruptura del aneurisma.

El propósito de este trabajo es reportar el caso de un paciente masculino de 80 años de edad internado en nuestra institución por leucemia en estudio. Como antecedentes de relevancia presentó hipertensión arterial, hipoacusia y tabaquismo. Por su patología de base se solicitó una tomografía de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste.

## Hallazgos imagenológicos

Como hallazgo incidental se evidenció dilatación fusiforme de vena yugular externa izquierda con calcificación y trombo mural asociado. Dichos hallazgos se correlacionaron posteriormente mediante Eco Doppler venoso de vasos del cuello. Se indicó conducta expectante otorgando el alta con pautas de alarma.





## Discusión

Para el diagnóstico diferencial, debemos tener en cuenta las masas cervicales. Determinados tumores y un laringocele podrían aparecer con los esfuerzos, también faringocele, malformaciones arteriovenosas, quistes parafaríngeos, branquiales y hernia pulmonar cervical.

Su diagnóstico en pacientes pediátricos se realiza fundamentalmente por la clínica, siendo indispensable en la población adulta complementar con EcoDoppler cervical, AngioTC y AngioRMN de cuello debido a su infrecuencia.

## Conclusión

Para concluir, podemos decir que la flebectasia de las venas yugulares, en especial la yugular externa y del lado izquierdo, como es el caso de nuestro paciente, es una patología infrecuente.

Por tal motivo y teniendo en cuenta la edad avanzada, toman relevancia los estudios complementarios por imágenes para realizar el diagnóstico definitivo.