

NEUMONIA POR STAPHILOCOCO EPIDERMIDIS

Autores: Agustina Martínez; Milton Fuentealba.

Mail: agustina208@hotmail.com

San Rafael, Mendoza, Argentina


Los autores no tienen conflicto de interés




Presentación del caso:

- Paciente de sexo masculino, sano previamente, de 16 años, ingresa desde guardia central a UTI pediátrica por fiebre, mal estado general, dificultad respiratoria de varios días de evolución
- Sospecha de COVID, con test negativo (genoma Viral SARS – COV2)
- Se observa además edema en mano y rodilla izquierda
- Al ingreso se realizó laboratorio, radiografía de tórax, ecografía de abdomen, partes blandas y pleural y posteriormente Tc de Tórax

Hallazgos imagenológicos:



Radiografía de Tórax: Infiltrado alveolar bilateral con imágenes nodulares radiodensas



Radiografía de Tórax: Infiltrado alveolar bilateral con imágenes nodulares radiodensas. Neumotórax.



Derrame pleural






Hallazgos imagenológicos:

- **Ecografía de Abdomen:** hepatoesplenomegalia. Ascitis
- **Ecografía de Partes Blandas:** colección intraarticular a nivel de la rodilla izquierda
- **Ecografía Pleural:** derrame pleural organizado, multiloculado, con broncograma aéreo bilateral

Hallazgos imagenológicos:

- Tomografía de Tórax: Múltiples imágenes nodulares hipodensas en ambos campos pulmonares





TCMC: Áreas de destrucción parenquimatosa y múltiples espacios quísticos intrapulmonares bilaterales (cavidades), con signos de fibrosis y neumotórax bilateral

DISCUSION

- El paciente presentó hemocultivo positivo para Staphiloco Epidermidis
- Tener en cuenta que en época de COVID, no todo es COVID. Otros gérmenes menos frecuentes como el Staphiloco Epidermidis puede producir neumonía con destrucción del parénquima pulmonar

CONCLUSION

1. Con la Tc se puede detectar, caracterizar y determinar el grado y la extensión de la afección pulmonar ya sea sistémica o primaria del pulmón, que previamente pueden haberse detectado en la radiografía, además facilita la identificación temprana de las lesiones y permite la aproximación diagnóstica y tratamiento precoz, pero tiene radiación ionizante
2. Recordar realizar una sola fase con contraste cuando es necesario y usar baja dosis

3.

