194

BOCIO INTRATORÁCICO

A. Ciccioli, M. A. Pierucci
Centro de diagnóstico por imágenes Alem

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES
ALEM

No presentamos conflictos de intereses.

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
agustinaciccioli@gmail.com

Paciente femenina de 58 años consulta tumoracion en región central del cuello.
No presenta antecedentes patológicos.



RX: se observa una opacidad paratraqueal derecha con signo cervicotorácico que indicaría localización en mediastino medio - posterior

TC: masa ubicada en mediastino medio, receso retrocavopretraqueal que se extiende a la región lateral derecho del cuello hasta el cartílago cricoides, con realce heterogéneo con el contraste ev, plano graso que la separa del lóbulo tiroideo ipsilateral. Mide DL: 90 mm por DT: 41 mm por DAP: 44 mm.









RM: masa hiperintensa y heterogénea en T2, con realce dishomogéneo tras la administración del contraste ev, sin restricción en difusión. Mide en sus diámetros máximos 98 x 41 x 38 mm.





DISCUSIÓN:

Se presenta el caso de una tumoración del cuello con probable diagnóstico de patología tiroidea, que se extiende al mediastino medio, no se reconocen adenomegalias regionales. Se plantean los posibles diagnósticos diferenciales de patología del mediastino medio. La masa si bien presenta realce heterogéneo con el contraste no presenta restricción en difusión por lo que se interpretó como de baja celularidad y probable etiología tiroidea. Se realiza punción para su diagnóstico. AP: Bocio multinodular con fibrosis y tiroiditis linfocitaria focal

CONCLUSION:

Si bien la patologia tiroidea es muy frecuente en el mediastino anterior, en nuestro caso significo un desafío ya que se presentaba en mediastino medio. Resaltamos la importancia de un correcto informe radiológico para orientar al cirujano para la elección de realizar una esternotomía en lugar de una simple incisión de cuello bajo para la resección del bocio retroesternal, siendo nuestro papel como radiólogos indispensable en la elección del tratamiento.

Bibliografia:

- E. Barcina García y cols. Revisión de los signos radiológicos de atelectasia pulmonar. Hallazgos en la radiografía simple y correlación con la tomografía computarizada. Presentación electrónica educativa SERAM 2012.
- Ben Nun A, Soudack M, Best LA. Bocio retroesternal de tiroides: 15 años de experiencia. (2006) Revista de la Asociación Médica de Israel: IMAJ. 8 (2): 106-9.
- JA Buckley, P. Stark. Bocio tiroideo mediastínico intratorácico: manifestaciones imagenológicas. (2013) AJR. Revista americana de roentgenología.