Nº 486

# DOLOR ABDOMINAL EN EL POSTPARTO INMEDIATO: ¿A QUIEN NO DEBEMOS OLVIDAR?


- Dr. Enrique Villa, Tec Belen Rodiguez, Dra Carolina Villa (caritovilla222@gmail.com)
  - Hospital Municipal "Santa Francisca Romana", Arrecifes, Bs As, Argentina

# DOLOR ABDOMINAL EN EL POSTPARTO INMEDIATO: ¿A QUIEN NO DEBEMOS OLVIDAR?



## Reporte de Caso:

Se presenta el caso de una primigesta de 17 años, apendicectomizada, sin otros antecedentes de relevancia, que fue sometida a un parto vaginal, espontaneo y a un legrado de Bumm para retirar restos placentario. Intercurre a las 72 hrs, con fiebre asociada a un severo y punzante dolor abdominal derecho. No presento nauseas, vómitos ni diarrea.
El examen físico revelo: dolor abdominal al tacto en fosa iliaca y flanco derecho.
Los estudios de laboratorio solo mostraron: anemia y leucocitosis.

## Hallazgos Imagenológicos:

Se realiza TC de Abdomen y Pelvis sin contraste en donde se evidencia: importante dilatación de la vena ovárica a expensas de la presencia de material espontáneamente denso en su interior, cambios inflamatorios de la grasa perivascular, escaso liquido libre y aumento del tamaño uterino. Hallazgos vinculables a trombosis de la vena ovárica derecha.
La paciente fue tratada con anticoagulantes endovenosos y antibióticos.

# DOLOR ABDOMINAL EN EL POSTPARTO INMEDIATO: ¿A QUIEN NO DEBEMOS OLVIDAR?



Dilatación de la vena ovárica a expensas de la presencia de material espontáneamente denso en su interior

## Discusión:

La trombosis de la vena ovárica es una complicación, rara, severa y potencialmente letal de puerperio. Su incidencia es baja (1/600 – 1/2000 partos). Ocurre principalmente en este período debido a su alto riego trombogenico.
El 90% se produce en la vena ovárica derecha por ser más larga, presentar más válvulas que sirven de asiento al trombo y por le existencia de un flujo anterógrado.
La severidad de esta enfermedad está relacionada con sus posibles complicaciones, como migración del trombo, sepsis y tromboembolismo pulmonar, el cual representa la primera causa de mortalidad materna en el puerperio (3%)

## Conclusión:

Aunque la trombosis de la vena ovárica sea una enfermedad infrecuente es potencialmente grave e infra-diagnosticada, por lo que es importante sospecharla ante una paciente, habitualmente en el postparto, que presente fiebre y dolor abdominal, sobretodo localizado en cuadrantes derechos. Para confirmarla y realizar su correcto diagnóstico, se debe solicitar una prueba de imagen. La ecografía se considera un método sub-óptimo para este fin debido a la interposición gaseosa intestinal. La RM se considera el "gold-estándar", en el caso de contar con este método diagnóstico, debido a que no requiere la administración de contraste endovenoso y por no contar con el riego de la radiación ionizante de la TC.

Por todo lo antes mencionado concluimos y enfatizamos en que es menester arribar a su correcto y oportuno diagnóstico para iniciar precozmente el tratamiento anticoagulante y evitar así, el posible desenlace fatal de esta rara patología.