



FIBROADENOMA GIGANTE DE LA ADOLESCENCIA: REPORTE DE UN CASO

Autores:

BEINAT Jorgelina, BILLORDO ZINI Santiago, IDIART Ana, LOGIOCO Fernanda, POLLINI Diana, PISANO Maria, VARELA Ana.



Hospital Z.G.A.D. “Evita Pueblo” de Berazategui

Declaración de conflicto de interés: los autores no expresan conflicto de interés.

Buenos Aires, Argentina. Email: jorgelina_beinat@hotmail.com

Presentación del caso:

Paciente femenina de 13 años de edad que es derivada por clínica médica a consultorio de guardia de ecografía por presentar tumoración dolorosa y eritematosa en región retroareolar de mama izquierda, de 7 días de evolución que empeoró en los últimos dos días.



Hallazgos imagenológicos

Se realiza ecografía mamaria bilateral, donde se visualiza formación sólida, heterogénea, de márgenes circunscriptos, que mide 58 x 45 x 35 mm de diámetro. Ambas axilas sin evidencia de adenopatías.

11 días después, dada su rápida evolución y empeoramiento de los síntomas se decide la intervención quirúrgica para su extirpación.

Se realiza exéresis de la tumoración mediante una incisión periareolar y se extrae una tumoración 7 x 6 x 4.5 cm. El estudio histológico confirma el diagnóstico de fibroadenoma.

Discusión:

El fibroadenoma juvenil o gigante, difiere del resto de los fibroadenomas en su presentación clínica y aspecto histológico. Estas lesiones constituyen alrededor del 4% de todos los fibroadenomas. Aparecen en la adolescencia, generalmente poco tiempo antes o después de la menarquia. Se presentan como una masa mamaria no dolorosa de crecimiento rápido y circunscrito, que puede alcanzar hasta 20cm o más, raramente se adhieren a la piel, la cual puede estar muy distendida en los casos de masas muy voluminosas.

Conclusión:

Dado que esta lesión presenta un rápido crecimiento y afecta la calidad de vida de la paciente, para el diagnóstico resulta de mucha utilidad la ecografía, ya que es un método sencillo y de fácil acceso. También es importante su estudio histopatológico a fin de establecer el diagnóstico diferencial con otras afecciones mamarias, importantes para el pronóstico y la conducta médica que se debe seguir.

Bibliografía

- 1. Fibroadenoma gigante juvenil
- R. García-Rodrígueza, M.A. Nietoa, C. Jiménezza, L. Labaoa, G. Hernández-Vicenteb
- a Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. España
- b Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. España