
Autor: Parolin Luisina, Vega Padilla Loraine

Residencia Diagnostico por Imágenes - Sanatorio Güemes

### PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 64 años de edad con antecedente de ex tabaquista. Concurre a la guardia por presentar retención aguda de orina y hematuria. Se le solicita ecografía abdominal y vesico prostática.



### **ECOGRAFÍA RENOVESICAL**


No evidencio engrosamiento focal de la vejiga, sin embargo se observo una imagen de aspecto nodular.

Autor: Parolin Luisina, Vega Padilla Loraine

Residencia Diagnostico por Imágenes - Sanatorio Güemes

## **DISCUSIÓN**

El carcinoma de vejiga debido al uso del tabaco es una asociación frecuente. Los fumadores presentan un riesgo entre dos y cuatro veces más elevado de sufrir esta neoplasia que la población general..



Autor: Parolin Luisina, Vega Padilla Loraine

Residencia Diagnostico por Imágenes - Sanatorio Güemes

### **CONCLUSIONES**

El carcinoma de vejiga en pacientes fumadores es una asociación frecuente, debe ser reconocido por el radiólogo para la diferenciación de otros diagnósticos que pueden presentarse de manera similar.



Autor: Parolin Luisina, Vega Padilla Loraine

Residencia Diagnostico por Imágenes - Sanatorio Güemes

### **BICLIOGRAFIA**

Bladder cancer, RADIOPAEDIA.

https://radiopaedia.org/articles/bladder-cancer

Urinary Bladder Cancer, RADIOGRAPHICS

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.322115125

Bladder Squamous Cell Carcinoma, RADIOGRAPHICS https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.243035153

