CADI 2022

CONGRESO ARGENTINO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

22 AL 24 DE SEPTIEMBRE

CEC:

Centro de Convenciones
Buenos Aires

“CAUDADO: LÓBULO HEPÁTICO OLVIDADO”

Autores: CAROCIO MARTIN, Mariana; RODRIGUEZ, Guillermo; HUALPA, Andrés; ROVELLA BATTOCCHIA, María Victoria; SADLER, Marcos Rodolfo; NOCETI, Maximiliano.

FUESMEN/Hospital Italiano de Mendoza.

Mendoza, Argentina.

mariana.carocio@gmail.com

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Repasar la anatomía del lóbulo caudado, su medición a través de los distintos métodos de diagnóstico por imágenes y patologías en las cuales podría verse afectado este segmento hepático.

RELACIONES ANATÓMICAS

Delimitado a la izquierda por la fisura del ligamento venoso, inferiormente por el porta hepatis y a la derecha por el surco de la vena cava inferior. Superiormente, se continúa con la fisura del ligamento venoso.

Ecografía abdominal corte longitudinal del LC y tomografía abdominal corte transversal del LC.

VASCULARIZACIÓN

PC: lóbulo caudado;
IVC: vena cava inferior; PV: vena porta; SP: lóbulo de Spiegel; RHV: vena hepática derecha; MHV: vena hepática media; LHV: vena hepática izquierda.

El lóbulo caudado está irrigado por las ramas primarias de la vena porta derecha e izquierda y la bifurcación hilar.

El otro parénquima localizado paracavamente irrigado por las venas porta segmentarias para P7 y P8.

● + ● = **dorsal liver**

VARIANTES ANATÓMICAS

- Rectangular, piriforme e irregular.
- Proceso papilar.
- Proceso caudado.
- Lóbulo caudado accesorio.

Existen patologías que pueden modificar el tamaño y la anatomía del lóbulo caudado, las cuales producen hipertrofia, hipotrofia o atrofia y agenesia. Otras lesiones focales benignas y malignas y la terapia radiante también podrían modificar su anatomía.

A-B- Cara visceral del hígado, diagrama y fotografía del lóbulo caudado rectangular.

E-F- Cara visceral del hígado, diagrama y fotografía del lóbulo caudado irregular.

C-D- Cara visceral del hígado, diagrama y fotografía del lóbulo caudado piriforme.

CL lóbulo caudado, GB vesícula biliar, IVC vena cava inferior, LL lóbulo izquierdo, RL lóbulo derecho, PH porta hepatis, QL lóbulo cuadrado.

PROCESO PAPILAR

- Elevación prominente y/o separación del lóbulo caudado propiamente dicho por una fisura parcial o total y separados por el surco del ligamento venoso del lóbulo izquierdo del hígado y el porta hepatis inferiormente.

TC de abdomen corte transversal y coronal, visualizándose proceso papilar (flecha).

PROCESO CAUDADO

- Elevación prominente y/o separación del lóbulo caudado propiamente dicho por una fisura parcial o total, extendiéndose hacia el lóbulo derecho y formando casi un techo relativamente ancho sobre el porta hepatis.

LÓBULO CAUDADO ACCESORIO INTRATORÁCICO

- Son **extremadamente raros** y generalmente se encuentran incidentalmente en pacientes asintomáticos.

A: TC coronal con contraste que muestra una masa paraaórtica supradiafragmática (flecha: 4,7×2,7 cm). B y C: la exploración axial sin contraste y la exploración post contraste muestran una densidad similar de la masa en comparación con el hígado (flecha).

A: imagen coronal en T2 que muestra masa supradiafrágica. Imágenes axiales en T2 sin saturación grasa (B) y con saturación grasa (C) muestran masa retrocava (flecha) con comunicación al hígado a través de un pedículo (punta de flecha). La masa muestra similar intensidad de señal en comparación con el hígado. Las imágenes axiales pre (D) y post contraste (E) confirman una intensidad de señal similar al hígado.

MEDICIÓN

- Puede ser usada para generar índices indicativos de diversas patologías como por ejemplo la cirrosis.
- Dentro de los cuales se destacan el cociente de Harbin, de Hess, del porta hepatis y los diámetros AP y CC.

ÍNDICE DE HARBIN CT/RL

Línea 1: pared lateral derecha de la vena porta principal (MPV).

Línea 2: paralela a la línea 1 en la cara más medial del lóbulo caudado.

Línea 3: perpendicular a las líneas 1 y 2, a mitad de camino entre MPV y la vena cava inferior (IVC), y extendido hasta el margen lateral del lóbulo derecho.

La distancia a lo largo de la línea 3, entre las líneas 1 y 2, fue el diámetro transversal del lóbulo caudado (TC) y ; la distancia a lo largo de la línea 3, entre el margen lateral del lóbulo derecho y línea 1, era el diámetro del lóbulo derecho (RL).

>0,65: 96% de probabilidades de Cirrosis.

ÍNDICE PORTA HEPATIS (SD x TD) / RL

Diámetro transversal del porta hepatis (**TD**): desde la extensión lateral del porta hepatis a la parte más medial del CL, pasando por la MPV.

Diámetro sagital del porta hepatis (**SD**): máxima extensión anteroposterior del porta hepatis.

VN: 0.30-1.43

2

ÍNDICE DE HESS ($CL \times CAP \times CT$) / RL

Diámetro anteroposterior mayor del lóbulo caudado (**CAP**): medido parasagitalmente a través del porta hepatis en la parte del lóbulo caudado que forma el techo del porta hepatis.

***AP: >35 mm: sensibilidad 52% especificidad 91% en diagnóstico de cirrosis silente.**

Diámetro longitudinal mayor del lóbulo caudado (**CL**) medido supero-inferiormente.

VN: 0.09-9.75

LÓBULO CAUDADO HIPERTROFIADO

- A. Cirrosis alcohólica. Lóbulo caudado agrandado y lóbulo hepático izquierdo atrófico. Ascitis presente. Vena porta reemplazada por múltiples venas pequeñas (flecha). Várices en ligamento gastrohepático.
- B. Cirrosis por oclusión de vena hepática (síndrome de Budd-Chiari). Lóbulo caudado aumentado de tamaño y comprime la porción intrahepática de vena cava inferior (flecha).

CONCLUSIONES

El lóbulo caudado es anatómica y funcionalmente independiente de los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. Reconocer su anatomía es fundamental para valorar su adecuada localización y valoración de las diversas condiciones en las cuales podría verse afectado.

BIBLIOGRAFÍA

- Sagoo, M.G., Aland, R.C. & Gosden, E. Morphology and morphometry of the caudate lobe of the liver in two populations. *Anat Sci Int* 93, 48–57 (2018). <https://doi.org/10.1007/s12565-016-0365-7>
- Paez SN, Schawkat K, Garces-Descovich A, Sawhney MS, Morteale KJ. Incidental finding of a supradiaphragmatic caudate lobe on cross-sectional imaging: An exceedingly rare entity. *Clin Imaging*. 2020 Mar;60(1):79-83. doi: 10.1016/j.clinimag.2019.11.009. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31864205.
- Dodds WJ, Erickson SJ, Taylor AJ, Lawson TL, Stewart ET. Caudate lobe of the liver: anatomy, embryology, and pathology. *AJR Am J Roentgenol*. 1990 Jan;154(1):87-93. doi: 10.2214/ajr.154.1.2104732. PMID: 2104732.