

NO TODO PATRON MILIAR ES TUBERCULOSIS

Morales Sabrina Anabel

sabri.morales.ok@gmail.com

Hospital Dr. Guillermo Rawson

SAN JUAN - ARGENTINA


Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés


PRESENTACION DE CASO

- Femenino 59 años
- APP: tabaquista, TVP anticoagulada.
- Comienza con dolor torácico, lateral derecho.
- Refiere caída de escalera de 2 semanas de evolución.
- Al ingreso se constata tos, refiere de inicio concordante a la caída.

Rx de Torax

Patrón miliar con micro nódulos en ambos campos pulmonares






TC DE TORAX.

Múltiples imágenes nodulillares calcificadas que comprometen de vértice a base ambos campos pulmonares.

Trazo de fractura de 2°, 3° y 4° arcos costales anterolaterales derechos.

NEUMONIA VARICELOSA



Es la complicación más grave de la infección diseminada por el virus de la varicela zoster con tasas de mortalidad del 9 al 50%.

Rara vez se da en sujetos previamente sanos, siendo frecuente en pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos, fumadores o embarazadas. Dichos factores no estaban presentes en nuestro paciente, la cual refirió que había tenido síntomas compatibles con varicela únicamente en su infancia.

HALLAZGOS POR IMAGENES

Se presenta en Rx de tórax como múltiples nódulos mal definidos que pueden ser confluentes y fugaces. Las lesiones pueden calcificarse y persistir como calcificaciones densas, bien definidas, dispersas al azar, de 2-3 mm.

En TAC: infiltrado intersticial típicamente nodular y difuso, como nuestro paciente, también puede manifestarse como nódulos con un halo en vidrio esmerilado, opacidad en parches en vidrio esmerilado y coalescencia de nódulos.




Fig. 9: Mujer de 53 años con antecedentes de neumonía varicelosa . A) radiografía de tórax PA: en el parénquima pulmonar se visualiza una afectación micronodular densamente calcificada. B) corte axial TC torácica: en ambos hemitórax se observa una afectación micronodular, con nódulos subcentimétricos, densamente calcificados y distribución aleatoria (circulo) C) imagen ampliada.

CONCLUSION

La neumonía por varicela es la complicación más frecuente y grave de la infección por el virus varicela zoster en adultos.

Es característica la discordancia clínico-radiológica, por lo que se debe realizar radiografía de tórax a todo adulto con varicela, con o sin clínica respiratoria.

Si bien, se asocia frecuentemente a pacientes con inmunidad comprometida, también debemos pensar en esta entidad en pacientes previamente sanos como en nuestro caso.

BIBLIOGRAFIA

