

993

**SOSPECHA DE COLANGIOCARCINOMA  
INTRAHEPÁTICO VS PSEUDO ANEURISMA DE  
ARTERIA HEPÁTICA**

Cardoso Gisela - Romero Branca Agustina - Sponton Benjamín - Tutino Ana

Buenos Aires, Argentina.

[Spontonbenjamin@hotmail.com](mailto:Spontonbenjamin@hotmail.com)

---



# Presentación del caso

Hombre de 65 años consulta por síndrome coledociano.

Antecedentes: Colecistectomía CPRE por litiasis extrahepática e intrahepática.

---

# Hallazgos imagenológicos



---

# Discusión

Los colangiocarcinomas intrahepáticos son la segunda neoplasia hepática primaria más frecuente, se presentan como lesiones focales redondeadas con realce centrípeto, pudiendo presentar realce uniforme en los de menor tamaño, no obstante, de mediar antecedentes quirúrgicos, plantean el diagnóstico diferencial con pseudoaneurismas de la arteria hepática que son secundarias a una complicación de drenaje biliar o colecistectomía. La Angiotomografía es el método de elección no invasivo para descartar, en primera instancia, pudiendo requerir la confirmación por hemodinamia y colangioscopia con biopsia.

---

---

# Conclusión

El colangiocarcinoma intrahepático formador de masa es la segunda neoplasia más frecuente, de presentar antecedentes quirúrgicos, no se debe excluir el diagnóstico diferencial de pseudoaneurisma, contando hoy en día con métodos por imágenes mínimos e invasivos para su confirmación y tratamiento.

---

---

# Bibliografía

- <https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/2026>
- [https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-01082010000100017&script=sci\\_arttext&tlng=es](https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-01082010000100017&script=sci_arttext&tlng=es)