ANGIOMIOLIPOMA GIGANTE EN PACIENTE CON ESCLEROSIS TUBEROSA

Autores:

Carolina Reyes Britto, Valledupar/Colombia, e-mail: caritorey20@gmail.com

Maria del Rosario Matticoli

Lucas Molina Genchi

Anahí Ricci

Declaramos no tener conflicto de interés.

PRESENTACIÓN DE CASO:

Masculino de 51 años, consultó por hematuria macroscópica, antecedentes de convulsiones, monorreno.

Laboratorios: Creatinina: 2,3 Urea: 0,59 Hb: 12,4 Hto: 37,3 Plaquetas: 206.000

Se indica Ecografía de abdomen, TC de tórax, abdomen y pelvis, TC y RM de encéfalo.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS:

Ecografía abdominal: Riñón derecho aumentado de tamaño, heterogéneo con alteración de su morfología. Riñón izquierdo ausente.

TC de tórax, abdomen y pelvis: imágenes quísticas pulmonares. Riñón derecho presenta voluminosa formación heterogénea, de densidad adiposa, la cual se extiende hacia la fosa ilíaca derecha donde muestra imágenes líquidas asociadas a una formación calcificada. Los hallazgos son vinculables a angiomiolipoma. Riñón izquierdo no visualizado. Hígado presenta angiomiolipomas.

TC de encéfalo: nódulos subependimarios calcificados.

RM de encéfalo: túbers corticales, hamartomas de la sustancia blanca y calcificaciones subependimarias.

Nº 0214

Angiomiolipoma renal
derecho.

Angiomiolipomas
hepáticos.

Quistes pulmonares
de distribución
difusa.

Nº 0214

Nódulos
subependimarios
calcificados.

Tuberosidades
corticales.

DISCUSIÓN: La esclerosis tuberosa es una enfermedad neurocutánea que se caracteriza por la presencia de una tríada clínica compuesta por discapacidad intelectual, convulsiones y adenomas sebáceos. Afecta a múltiples órganos, con la presencia de tumores benignos, túbers corticales, linfangioleiomiomatosis, angiomiolipomas renales, entre otros, constituyendo criterios mayores y menores para definir diagnóstico.

CONCLUSIÓN: es importante el conocimiento de la afectación multisistémica de la esclerosis tuberosa por parte del especialista en diagnóstico por imágenes, mediante la descripción de los hallazgos radiológicos por TC y la RM, las cuales son las técnicas de imagen de elección, que proporcionan una alta especificidad diagnóstica ante la sospecha clínica de esta entidad.

BIBLIOGRAFÍA:

-J. Docampo, M. Cabrini, C. Bruno, C. Morales. Esclerosis tuberosa: evaluación de las lesiones intracraneanas, Revista Argentina de Radiología, Volume 77, Issue 4, 2013. <https://doi.org/10.7811/rarv77n4a05>

-Von Ranke FM. Imaging of tuberous sclerosis complex: a pictorial review. Radiol Bras. 2017 Jan-Feb;50(1):48-54. doi: 10.1590/0100-3984.2016.0020.