Nº 1048

CAJA NACIONAL
DE SALUD

PARAGANGLIOMA INTRA-ADRENAL

Dr. Daniel Jose Ochoa Zenteno
Dra. María Angela Tejerina Copa
Dra. Cristina Viviana Peñaranda Sotillo
Dr. Javier Rodríguez Alvarado
Dra. Lizet Zeballos Baldiviezo

TARIJA - BOLIVIA

danielochoa708@hotmail.com

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

TC contrastada en corte axial y coronal muestra una gran masa retroperitoneal izquierda hipodensa con áreas de menor densidad en su interior(compatible con necrosis) y con moderado realce periférico ante el contaste endovenoso.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

RM en secuencia T1 con saturación grasa en corte axial muestra masa retroperitoneal paravertebral izquierda con intensidad de señal heterogénea

RM en T2 con saturación grasa en corte axial muestra mayor intensidad de señal en comparación con el tejido muscular y áreas líquidas intratumorales sugerentes de necrosis.

DISCUSIÓN

**El paraganglioma
intraadrenal es infrecuente.**

**Surgen de las células
cromafines de la médula
suprarrenal causando
hipertensión secundaria no
controlada.**

**La primera sospecha de
feocromocitoma suele ser la
presencia de metanefrinas
urinarias o plasmáticas de 24
horas, metabolitos de
norepinefrina y epinefrina.**

**Cuando estos hallazgos son
positivos se realizan
estudios de imagen para
localizar el o los tumores**

CONCLUSIÓN

La sospecha del paraganglioma adrenal en la mayoría de los casos es clínico con presencia de hipertensión secundaria y catecolaminas urinarias positivas.

Las pruebas de imagen son útiles para valorar la extensión y confirmar el diagnóstico principalmente la TAC y RM por su mayor caracterización.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gong J, Wang X, Chen X, Chen N, Huang R, Luc, Chen D, Zeng H, Zhou Q. Adrenal and extra adrenal nonfunctioning composite pheochromocytoma/ Paraganglioma with immunohistochemical ectopic. Hormone expresion: Comparison of two cases. Urol. 2010; 85(3): 368 -72.
2. J, Li HZ, Ji ZG, Mao Qz, Shi BB, Yan WG. A decade of clinical experience with extra - adrenal paragangliomas of retroperitoneum. Report: report of 67 cases and a literature review. Urol. Ann. 2010; 2(1):12-16.