



1202

Hidradenoma papilífero de la vulva


Emiliano Gomez (emiedugomez62@gmail.com); Manuel Surur; Paula tiscornia
Servicio de diagnóstico por imágenes, Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.




Presentación de caso:

Paciente consulta por prurito y tumefacción en zona vulvar izquierda. Al examen físico se observa lesión de crecimiento exofítico a nivel del tejido celular subcutáneo, acompañado de signos de flogosis. Sospecha clínica de bartolinitis. Se solicita ecografía de partes blandas y RM de pelvis por dolor pelviano.

Hallazgos imagenológicos



Ecografía de partes blandas: Imagen quística con contenido anecoico y componente sólido adherido a la pared, sin vascularización al examen Doppler color.



RM de pelvis: A nivel del labio externo derecho, se observa imagen quística con contenido líquido y nódulo mural hipointenso en secuencias convencionales, que muestra realce parietal y nodular post-gadolinio.

Discusión

El hidradenoma papilífero vulvar es un tumor benigno raro que se origina de las glándulas apocrinas tipo mamarias (Mama-Like) en la dermis de la región anogenital (mayor frecuencia en mujeres) o más raramente extragenital (mayor frecuencia en hombres). La transformación maligna de estos tumores es muy rara y se encuentran muy pocos casos descritos en la bibliografía.

Clínicamente son asintomáticos aunque pueden manifestarse con prurito, dolor, sangrado o sobreinfección, presenta aspecto quístico de crecimiento exofítico y puede ulcerarse y sangrar simulando un carcinoma.

Discusión

Imagenologicamente, son lesiones predominantemente quísticas con componente sólido, pueden presentar vascularización al examen Doppler en ecografía y ávido realce con gadolinio en resonancia magnética, pudiendo asociarse a cambios hemorrágicos. El tratamiento de elección es la escisión local y se ha descrito recurrencia en escisiones incompletas. Presenta múltiples diagnósticos diferenciales, incluyen: adenoma tubular apocrino, bartolinitis, siringocistoadenoma papilífero, granuloma piógeno, hemangioma, quiste mucoso vestibular, neoplasia, pólipo, hemorroides, hidrocistoma apocrino y fibroadenoma.

Conclusión

El hidradenoma papilífero es una entidad poco común, en general asintomática, condicionando un diagnóstico tardío el cual representa un desafío clínico-imagenológico y plantea diagnósticos diferenciales con múltiples entidades.

Es una neoformación benigna sin embargo, puede generar complicaciones por sobreinfección o por efecto de masa, simulando un carcinoma y en raras ocasiones, puede dar origen al desarrollo de lesiones malignas, por lo que se recomienda su escisión quirúrgica completa.

Bibliografía:

Scurry J, Vander Putte SCJ, Pymon J, Chelly N et al.,
Mammary-like gland adenoma of the vulva: review of 46 cases,
Pathology 2019; 44:372-8

Mullaney PJ, Becker E, Graham B, Ghazarian D, Riddell RH,
Salonen DC. (2007) Benign hidradenoma: magnetic resonance
and ultrasound features of two cases. Skeletal Radiol
36:1185-90. (PMID: 17624528)