SÍNDROME DE MAY THURNER

Autores: María Florencia GARAY PÍA, Maira OROZCO MERINO, Anahí GORANSKY, Ana Cecilia ROSSOMANDO

Jefe del servicio: Oscar Eduardo ORELLANO

Institución: CIMAC, San Juan, Argentina. florgaraysj@gmail.com

CASO CLÍNICO

♂ **25 años**
de edad

APP: Consumidora de
Anticonceptivos orales,
sin otro antecedente
personal patológico

MC: Dolor en
miembro inferior
izquierdo

EXAMEN FÍSICO: Asimetría del
tamaño en miembros inferiores con
mayor volumen y temperatura del
miembro inferior izquierdo

LABORATORIO:
Dentro de límites normales

ECO DOPPLER DE MIEMBROS INFERIORES:
TVP miembro inferior izquierdo

**T.C. DE ABDOMEN Y
PELVIS CON
CONTRASTE
ENDOVENOSO**

↓
Compresión extrínseca
de la vena ilíaca primitiva
izquierda entre la arteria
ilíaca primitiva derecha y
la columna lumbar a
nivel del disco
intervertebral L4-L5
(distancia entre estas dos
estructuras de 2 mm)

↓
TVP que
compromete a las
venas ilíacas
primitiva interna y
externa izquierdas y
a todo el miembro
inferior izquierdo

S. DE MAY THURNER

1034

Caracterizada por la compresión extrínseca de la vena ilíaca primitiva izquierda entre la arteria ilíaca primitiva derecha y la columna vertebral a la altura del cuerpo vertebral de la quinta vértebra lumbar o el promontorio del sacro justo antes de la unión iliocava

Variante anatómica

Mujeres entre la 3ª y 5ª década de vida.
Personas con poca grasa peritoneal

Asociada inmovilidad, embarazo, anticoncepción oral, trauma o cáncer

Asintomática hasta TVP izquierda

Dolor, edema, tumefacción, claudicación intermitente e insuficiencia venosa

Complicaciones : Ruptura espontánea del vaso, tromboembolismo pulmonar o flegmasía cerúlea dolens

Obstrucción mecánica al flujo

Hiperplasia intimal

Formación de bandas de elastina y colágeno en la luz vascular como consecuencia de la transmisión de la fuerza pulsátil crónica desde la arteria que ocasiona fricción entre las paredes de la vena

La disminución de la luz vascular, con el compromiso del drenaje venoso conduce a la presencia de edema unilateral, aparición de circulación colateral y trombosis aguda de la vena ilíaca primitiva

DIAGNÓSTICO

Gold-estándar: Venografía ilíaca.
Por ser invasiva y en casos de requerir un rápido diagnóstico, se prefiere comenzar con otros métodos diagnósticos (Eco doppler de miembro inferior y/o TC con contraste endovenoso)

TRATAMIENTO

Endovascular (angioplastia con parche venoso y endoprótesis)

CONCLUSION

Es muy importante considerar a esta patología como diagnóstico en pacientes jóvenes con trombosis venosa en miembros inferiores, solicitar la TC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, para confirmarla y descartar complicaciones, ya que se trata de una patología mecánica con tratamiento específico

- Saldarriaga E.L. , Vinasco M. , Jaimes D. A. 2016. May-Thurner syndrome as a differential diagnosis in recurrent thrombosis. Acta Med Colomb Vol. 41 N° 1 .*Síndrome de May-Thurner Acta Médica Colombiana Vol. 41 N°1*
- Knuttinen M. G., Naidu S., Oklu R., Kriegshauser S., Eversman W., Rotellini L., Thorpe E. 2017. *May-Thurner: diagnosis and endovascular management.*
doi: 10.21037/cdt.2017.10.14
- Cil B., Akpınar E., Karcaaltincaba M., Akinci D. 2004. *Case 76: May-Thurner Syndrome*
doi.org/10.1148/radiol.2332030152
- Gil Martín A.R, Carreras Aja M., Arrieta Ardieta I., Labayen Azparren I., 2014. *Cockett's syndrome, May-Thurner syndrome, or iliac vein compression syndrome.* *10.1016/j.r*
10.1016/j.rx.2011.12.011