TRABAJO N° 1025

UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA DE BAJA DOSIS EN LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE LA RETRANSITACIÓN EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE CIRUGIA DE HARTMANN

**Autores: Gervasio SASIA, Fabricio Victor SASIA, Gabriel YOCCO,
Magali MARCHETTI, Celeste IPARRAGUIRRE, Diego JEANDREVIN**

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses que puedan haber influido en los resultados presentados

HOSPITAL PRIVADO
SADIV

San Pedro, Buenos Aires, Argentina – gervasiosasia@gmail.com

Objetivos de aprendizaje

- Difundir la utilización de este protocolo de estudio
 - Mejorar la planificación quirúrgica de los pacientes con cirugía de Hartmann en plan de retransitación.
 - Reducir la morbi-mortalidad intra y postquirúrgica de estos pacientes
 - Fomentar la utilización de técnicas imagenológicas de baja dosis
 - Reducir el tiempo de exploración de estudios
 - Demostrar la experiencia en nuestro centro
-

Revisión del tema

Introducción:

- Clásicamente se solicita “colon por enema a doble cabo” para la planificación de retransitación
 - Las tasas de morbilidad de estas cirugías rondan el 60% a corto plazo y el 40% a largo plazo
 - La disponibilidad de salas con seriógrafos es cada vez menor, generando una alta demanda contenida
-

Revisión del tema

Con el equipo quirúrgico del Hospital Privado SADIV se propone una nueva técnica de exploración bajo Tomografía Computada que consiste en lo siguiente:

1. Posicionar al paciente en decúbito lateral izquierdo
 2. Canalización anal con Sonda Foley 24 fr, insuflación de balón y pasaje de aire a baja presión para distender el muñón rectal
 3. Posicionar al paciente en decúbito dorsal
 4. Canalización de la ostomía con Sonda Foley 10 fr, con insuflación de balón
-

Revisión del tema

5. Elegir el protocolo de Colonoscopia Virtual en decúbito supino
 6. Chequear Kv y mAs
 7. Realizar barrido tomográfico del abdomen en inspiración
 8. Revisión de imágenes
 9. Retirar ambas sondas
 10. Finalizar el estudio
-

Revisión del tema

Materiales:

Fig. 1: Tomógrafo Multislice 16 canales

Fig. 2: Insumos de canalización: Jeringa de 20 cc, guantes estériles, Sonda Foley 24 fr y 12 fr.

Revisión del tema

Ventajas:

- Preparación del paciente: Sólo ayuno
 - Tiempo de Ocupación de Sala inferior a 20 minutos
 - Confort del paciente
 - No utilización de medios de contraste digestivo ni endovenoso
 - Utilización de insumos de bajo costo
 - Baja dosis de radiación
-

Revisión del tema

Ventajas:

- Adquisiciones volumétricas
 - Revisión de imágenes en planos ortogonales y 3D
 - Caracterización de eventraciones de asas en la ostomía
 - Identificación de redundancias del cabo proximal
 - Hallazgos extra colónicos
-

Revisión del tema

Postproceso de las Imágenes

Fig. 3: Análisis del muñón rectal con software de colonoscopia virtual. A: Volumen Renderig. B: Vista del lumen.

Revisión del tema

Postproceso de las Imágenes

Fig. 4: Análisis del muñón rectal con software de colonoscopia virtual. A: reconstrucción axial. B: Navegación del lumen.

Revisión del tema

Postproceso de las Imágenes

Fig. 5: Navegación del lumen.

Fig. 6 A y B: Medición de distancia entre cabos en dos planos.

Revisión del tema

Postproceso de las Imágenes

Fig. 7 A y B: Medición de distancia entre cabos en dos planos.

Revisión del tema

Plantilla de Informe:

TOMOGRAFIA DE BAJA DOSIS PARA RETRANSITACION

PROCEDIMIENTO

Se realizó tomografía computada de baja dosis luego de realizar canalización del recto y cabo proximal de colostomía con sonda balón.

Las imágenes obtenidas se post-procesaron en software de colonoscopia virtual y se registraron en PACS.

INTERPRETACION

Longitud del muñón rectal:

Localización del extremo más cefálico: Central / Lateralizado Derecha / Izquierda

Alteración de la grasa locorregional: Si / No

Redundancia del cabo proximal: Presente / Ausente

Distancia máxima entre cabos en dos planos:

Eventraciones de la ostomía: Presente / Ausente

Otros defectos de la pared abdominal.

Hallazgos extracolónicos:

Atte.

Fig. 8: Captura de plantilla de informe del Hospital Privado SADIV.

Revisión del tema

	TC baja dosis	Colon por Enema a doble cabo
Tiempo de ocupación de Sala	13 min – 17 min	24 – 34 min
Dosis de radiación recibida	2 – 3 mSv	3 – 4 mSv
Confort del paciente	Mayor	Menor
Costo en insumos / medicamentos	Bajo	Significativamente alto
Información para el cirujano	Completa	Incompleta

Tabla 1: Comparativa entre la tomografía de baja dosis y el colon por enema a doble cabo.

Conclusiones

- El presente estudio puede utilizarse como alternativa para la planificación quirúrgica de retransitación, teniendo en cuenta la creciente falta de equipos con radioscopia
 - Las mayores ventajas se relacionan a la disponibilidad, el bajo costo, la baja irradiación y el confort del paciente
 - El equipo quirúrgico de nuestro centro se muestra conforme con la información recibida, teniendo en cuenta además la reproducibilidad del estudio
-

Bibliografia

- Pickhardt P. Screening CT Colonography: How I Do It. AJR Am J Roentgenol. 2007;189(2):290-8. [doi:10.2214/AJR.07.2136](https://doi.org/10.2214/AJR.07.2136) - [Pubmed](#)
 - Pickhardt P. Differential Diagnosis of Polypoid Lesions Seen at CT Colonography (Virtual Colonoscopy). Radiographics. 2004;24(6):1535-56; discussion 1557. [doi:10.1148/rg.246045063](https://doi.org/10.1148/rg.246045063) - [Pubmed](#)
 - Saglam M & Ors F. Virtual Colonoscopy: Indications, Techniques, Findings. Endoscopic Procedures in Colon and Rectum. 2011. [doi:10.5772/19651](https://doi.org/10.5772/19651)
 - Patteet E, Van Hoof S, Hendrickx T, Van den Broeck S, Hubens G, Komen N. Is length of the rectal stump predictive for postoperative outcome in Hartmann's reversal surgery? A multicenter experience of 105 consecutive cases. Int J Colorectal Dis. 2022 Mar;37(3):617-622. doi: 10.1007/s00384-021-04090-7. Epub 2022 Jan 29. PMID: 35091774
-