

Diverticulitis de Meckel

Un diagnóstico posible por TC

Pegoraro Diego, Golab Kathia, Hunger Erik



Presentación del caso

Paciente femenino de 61 años

Dolor en fosa ilíaca derecha


24 horas de evolución

Leucocitosis

Náuseas

Pérdida del apetito

Antecedente de apendicectomía




Presentación del caso



Hallazgos imagenológicos

Estructura diverticular
Dependiente del íleon distal
Contenido líquido



Hallazgos imagenológicos

Engrosamiento parietal
Realce mucoso
Cambios inflamatorios de la grasa
mesentérica adyacente



Discusión

Malformación congénita más frecuente del tubo digestivo
Íleon distal a 40-100 cm de la válvula ileocólica

Asintomático más frecuente

Complicaciones

- Diverticulitis
- Hemorragia
- Obstrucción intestinal
- Hemorragia
- Perforación
- Invaginación



Conclusión

La diverticulitis de Meckel es una complicación poco frecuente pero importante asociada con el divertículo de Meckel.

La TC abdominal desempeña un papel crucial en su evaluación y diagnóstico. Los hallazgos radiológicos, como el engrosamiento de la pared intestinal, la inflamación de la grasa mesentérica pueden confirmar el diagnóstico.

Bibliografía

- Elsayes K, Menias C, Harvin H, Francis I. Imaging Manifestations of Meckel's Diverticulum. AJR Am J Roentgenol. 2007;189(1):81-8
- Kusomoto H, Yoshida M, Takahashi I., et al. Complications and diagnosis of Meckel's diverticulum in 776 patients. Am J Surg 1992
- Satya R & O'Malley J. Case 86: Meckel Diverticulum with Massive Bleeding. Radiology. 2005;236(3):836-40
- Lee N, Kim S, Jeon T et al. Complications of Congenital and Developmental Abnormalities of the Gastrointestinal Tract in Adolescents and Adults: Evaluation with Multimodality Imaging. Radiographics. 2010;30(6):1489-507