

643

# “No sólo está en los ganglios ... presentación extranodal del linfoma”

HOSPITAL MATERNO INFANTIL FLORENCIO ESCARDO

**AUTORES:** IAN VILLALBA FONSECA, MARWUIN SUÁREZ HERNÁNDEZ, DIANA ANDRADE GUERRERO, LIZBETH POSSO MORALES, EZEQUIEL LEVY YEYATI

**CADI 2023**

**ANTICIPANDO EL FUTURO**

## OBJETIVO

Conocer los sitios extranodales mayormente afectados por el linfoma. Saber las formas de presentación del linfoma extranodal según su ubicación y familiarizarse con los hallazgos imagenológicos característicos.

## REVISIÓN DEL TEMA

La enfermedad extraganglionar puede afectar a cualquier órgano. Dentro de éstos se mencionan: El linfoma primario del SNC, es el segundo tumor primario más frecuente del SNC, se presenta como lesión ocupante de espacio solitario en su mayoría, tiene predilección por la sustancia blanca periventricular, suele afectar el cuerpo calloso y cruzar la línea media. El linfoma torácico (pulmón, pleural o mediastinal) y hepatobiliopancreático presentan baja frecuencia. El linfoma gastrointestinal representa el sitio más común de linfoma extranodal y suele presentarse como marcado engrosamiento parietal.



## CONCLUSIÓN

Conocer e identificar las diferentes formas de presentación del linfoma es importante para hacer una aproximación diagnóstica, siendo la tomografía el Gold estándar para la estadificación y pronóstico del paciente.

# BIBLIOGRAFÍA

Sierra del Rio M, Rousseau A, Soussain C, Ricard D, Hoang-Xuan K. Primary CNS lymphoma in immunocompetent patients. *Oncologist*. 2009;14:526 -39.

Iwamoto FM, DeAngelis LM. An update on primary central nervous system lymphoma. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2006;20:1267 -85.