


PACIENTE EN EDAD PEDIÁTRICA CON PAPILOMA INTRADUCTAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Autores: Ileana Solange LÓPEZ GUERRICO, Carolina
Liliana CHOUELA, Maria Laura RICO, Lucía Macarena LENES
RADICE, Marcela LINARES, Mercedes MAINO


Presentación del caso.

- Paciente femenina de 9 años de edad, sin antecedentes familiares de patología mamaria, consulta por presentar secreción hemática por el pezón de mama izquierda.
- Al examen físico, se constata la presencia de nódulo palpable retroareolar, asociado a telorragia.
- Mama derecha sin particularidades.
- No se palpan adenomegalias axilares.

Hallazgos imagenológicos.



El estudio ecográfico sobre ambas mamas mostró una ecoestructura fibroglandular, evidenciándose en la región RA de MI la imagen nodular hipoecoica, con halo anecoico, mide 14 x 11 x 17 mm, presenta escaso realce periférico al Doppler color.



Mama izquierda: parénquima mamario con tejido a predominio fibroglandular.

En la región RA se observa imagen nodular ya conocida de contornos netos, mide 15x14x13mm. Presenta halo hiperintenso en T1 y T2, de probable origen hemático. No presenta realce postcontraste.

Ganglios axilares de forma, tamaño e intensidad habitual.

Mama derecha sin hallazgos a reseñar.

**Se realiza exéresis quirúrgica con resultado histopatológico:
PAPILOMA INTRADUCTAL de 0.8 cm.**

Discusión

- Las enfermedades que afectan a la glándula mamaria en la edad pediátrica son infrecuentes.
- El papiloma intraductal es una proliferación de células epiteliales y mioepiteliales que recubren la luz de los ductos de la glándula mamaria.
- Mayor prevalencia entre la 4ta y 5ta década de vida, se caracteriza clínicamente por derrame sanguinolento o serosanguinolento por el pezón en más del 80% de los casos. En casi la mitad de éstos, la secreción se acompaña por la presencia de una masa palpable unilateral retroareolar de 3 o 4 cm.
- Se considera factor de riesgo para el carcinoma invasivo.

Conclusión:

- Interesa la edad de presentación del caso debido a la escasa casuística descrita en la literatura, ya que esta patología tiene mayor prevalencia en la 5ta y 6ta década y en mujeres jóvenes la literatura describe casos de pacientes adolescentes, no pediátricas.

Bibliografía:

- Fernández T, Á., & Reigosa Y, A. (2015). Riesgo de cáncer de mama en mujeres con patología mamaria benigna. *Salud y comunidad*, 13(1), 78–86. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-32932015000100011.
- Papiloma intraductal metacrónico en un niño. Caso clínico. (2015). *Archivos argentinos de pediatría*, 113(6). <https://doi.org/10.5546/aap.2015.e314>