OSPEDALE ITALIANO

HOSPITAL
ITALIANO
de Buenos Aires

ANÁLISIS POR RM DE ALINEACIÓN ROTACIONAL EN PEDIÁTRICOS CON LUXACIONES ROTULIANAS

Arguello, Juan Facundo; Marquesini Lopez, Mauricio Omar

*Servicio de Diagnóstico por imágenes, Hospital Italiano de Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina*

Los autores declaran no tener conflictos de intereses

jfacundo.arguello@hospitalitaliano.org.ar

INTRODUCCIÓN

La inestabilidad patelofemoral es un proceso multifactorial

Existen variantes anatómicas que favorecen la luxación rotuliana ante un evento traumático como la displasia troclear, rótula alta, lateralización de la TTA y retroversión femoral

La RM juega un papel fundamental a la hora de evaluar el daño capsulo-ligamentoso y evaluación cuali-cuantitativa de estos factores de riesgo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las secuencias elegidas para estudiar a estos pacientes son T1 y DP, en nuestro centro contamos con un resonador 3T donde el protocolo está estandarizado y de corta duración. Se realiza una adquisición de 3 bloques de escaneo, que contienen 43 cortes cada uno (tiempo de escaneo de cada bloque 34 seg.) y se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la punta de los dedos de los pies; ambas piernas se incluyen en el campo de visión.

ANÁLISIS POR RM DE ALINEACIÓN ROTACIONAL EN PEDIÁTRICOS CON LUXACIONES ROTULIANAS

Displasia troclear

Anomalía anatómica caracterizada por una geometría anormal de la articulación patelofemoral

Retroversión femoral

Rotación externa de la cabeza femoral

Lateralización de la tuberosidad tibial

Inserción lateral del tendón rotuliano en la tibia

Rótula alta

Inserción muy proximal del tendón rotuliano

Retroversión femoral: ángulo formado entre el eje del cuello femoral y el fémur distal

Orientación
del cuello
femoral en
relación a los
cóndilos a
nivel de la
rodilla

Valor normal $14 \pm 7^\circ$

Torsión tibial: ángulo entre el ángulo tibial proximal y tibial distal

Valoración de la rotación tibial a lo largo del eje longitudinal.

Valor normal 25±7°

ANÁLISIS POR RM DE ALINEACIÓN ROTACIONAL EN PEDIÁTRICOS CON LUXACIONES ROTULIANAS

Distancia TAT/SIC: ángulo entre tuberosidad tibial anterior y surco intercondileo

Determina el valgo del aparato extensor de la rodilla y la distancia entre la TAT y el surco troclear da una idea del vector en valgo del aparato extensor

Valor normal <15 mm.

Ángulo troclear: entre las facetas medial y lateral

Útil para
determinar
inestabilidad
femororrotulia
na y displasia
troclear

Valor normal $<140^\circ$

Ángulo Q: línea desde EIAS al centro de la rótula y la TAT

Traduce la fuerza de tracción del cuádriceps sobre la rótula

Valor normal $<15^\circ$

Línea de Mikulicz: distancia desde el centro de la rodilla al eje de la pierna

Debe intersectar
la tibia en una
superficie que
se encuentra
entre ambas
espinas tibiales

**Varo >15 mm.
Valgo <5 mm.**

CONCLUSION

Aunque nuestros hallazgos sugieren que la malrotación puede ser un factor importante, existen otras condiciones patológicas que predisponen a la inestabilidad de forma totalmente independiente de las deformidades rotacionales, como se ha demostrado en el caso de la displasia troclear y la rótula alta.

Este estudio guía a decidir la terapéutica, evitando estudios con radiaciones.

REFERENCIAS

1. Diederichs, G. *et al.* Magnetic resonance imaging analysis of rotational alignment in patients with patellar dislocations. *Am. J. Sports Med.* **41**, 51–57 (2013). <https://doi.org/10.1177/0363546512464691>
2. Miranda, E., V. *et al.* IMAGING STUDIES OF THE PATELLOFEMORAL JOINT: CURRENT REALITY. *Rev. chil. radiol.* **16**, 101–115 (2010). <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082010000300003>
3. Fulkerson, J. P. & Shea, K. P. Disorders of patellofemoral alignment. *J. Bone Joint Surg. Am.* **72**, 1424–1429 (1990). *The Journal of Bone & Joint Surgery* 72(9):p 1424–1429, Oct 1990.