

0211-SÍNDROME-DE-HERLYN-WERNER-WÜNDERLICH-(SHWW)- COMPLICADO:-A-PROPÓSITO-DE-UN-CASO.

Paulina Ulloa, Susi Hevia, José Araya, Antonio Marchioni, Lesly Gallegos, Anita Salas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Caso clínico:

Nuligesta de 19 años, monorrena congénita izquierda, consulta por cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha asociado a emesis. Al examen físico destaca Blumberg positivo en cuadrante inferior derecho. Presenta aumento de parámetros inflamatorios por lo que se deriva a Servicio de Radiología para realizar una ecografía abdominal para descartar apendicitis. Luego del procedimiento es llevada a pabellón para una laparotomía exploratoria donde finalmente se realiza una salpingectomía derecha y drenaje del absceso tubo-ovárico (ATO).

Hallazgos imagenológicos:

A nivel parauterino derecho se identifica imagen heterogénea, con estructura de aspecto tubular y límites lobulados, con vascularización a la señal Doppler Color y líquido libre de baja cuantía, sin relación aparente con asas intestinales. Esta lesión mide aproximadamente 6,7x 6,4x 5,1 cm, sugerente de ATO derecho. Escaso líquido libre peritoneal. Monorrena izquierda y útero bicornue.



Discusión:

El SHWW es una rara malformación congénita mülleriana del tracto genital femenino que se presenta en la adolescencia y puede causar dolor abdominal agudo cíclico y disfunción menstrual. Se caracteriza por la presencia de agenesia renal, hemivagina obstruida y útero didelfo, lo que resulta en la acumulación de sangre menstrual y puede llevar a la formación de un hematoma pélvico. La ecografía es la imagen de entrada y puede complementarse con una RM para mejor visualización de las anomalías uterinas y vaginales. Puede presentar complicaciones graves como infecciones (ATO o colecciones), endometriosis e infertilidad.

Conclusión:

El SHWW es una anomalía urogenital compleja, poco frecuente, que presenta una elevada posibilidad de complicaciones que ponen en riesgo su futuro sexual y reproductivo, lo que nos obliga a establecer un diagnóstico clínico temprano para instaurar un manejo adecuado, considerando la evaluación ecográfica con enfoque ginecológico en mujeres en edad fértil que presentan sintomatología sugerente de abdomen agudo. Con mejor comprensión de esta condición, podemos desarrollar tratamientos más efectivos y ayudar a las mujeres a lograr una salud reproductiva óptima.