Papilomatosis mamaria: una patología poco frecuente.

Autores: Sarobe, Agustina¹; Vega, María Milagros¹; Kogan, Lucía²; Dass, Belén²; Vidales, Valeria.³; Garcia, Adriana.⁴.

1 - Médicas Residentes del servicio de Diagnóstico por imágenes del Hospital Británico

2 - Médicas Fellow del Área de la Mujer del servicio de Diagnóstico por imágenes, del Hospital Británico

3 - Médica de Staff del servicio de Diagnóstico por imágenes del Hospital Británico

4- Jefa de Servicio del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Británico

Los autores no declaran tener conflicto de intereses.

Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina.

E-mail de contacto: agos_sarobe@hotmail.com

OBJETIVOS

- Describir las características clínicas imagenológicas de las lesiones papilares de la mama.
- Identificar los hallazgos imagenológicos de la papilomatosis mamaria.
- Ejemplificar con casos clínicos y su correlación anatomopatológica.

REVISIÓN DEL TEMA

- Las lesiones papilares de la mama son un grupo heterogéneo de lesiones que pueden ser benignas o malignas y tienen una morfología variada que conllevan a un diagnóstico y tratamiento personalizado.
- Los papilomas benignos de la mama se dividen en papilomas solitarios, papilomatosis múltiple y papilomatosis juvenil.
- La papilomatosis múltiple es una patología benigna poco frecuente que se caracteriza por la presencia de proliferaciones papilares en múltiples unidades ductolobulillares terminales. Suele ser periférica y bilateral. Se considera papilomatosis cuando coexisten más de 5 papilomas en un mismo cuadrante.
- Clínicamente se presentan como masas palpables. Los hallazgos en la mamografía son variables e inespecíficos y la ecografía puede mostrar nódulos hipoeoicos intraductales o masas complejas con áreas quísticas internas.
- Se asocian con mayor riesgo de cáncer de mama, hasta en un 10%.

LESIONES PAPILARES DE LA MAMA

PAPILOMATOSIS MAMARIA

- ★ Periférica y bilateral.
- ★ Se considera papilomatosis cuando coexisten más de 5 papilomas en un mismo cuadrante.

Se asocian con mayor riesgo de cáncer de mama, hasta en un 10%.

- Mulligan AM, O'Malley FP. Papillary lesions of the breast: a review. *Adv Anat Pathol* 2007;

- Benjamin C Calhoun, Laura C Collins. Recommendations for excision following core needle biopsy of the breast: a contemporary evaluation of the literature. *Histopathology*. Jan 2016.68: 138-151

En los papilomas sin atipia biopsiados con aguja gruesa 45 % sugirió seguimiento y 55 % exéresis quirúrgica. Si la lesión fue removida en su totalidad con BAV el 100 % sugirió seguimiento imagenológico.

Third International Consensus Conference on lesions of uncertain malignant potential in the breast (B3 lesions)

Constanze Elfgen^{1, 2}, Cornelia Leo³, Rahel A Kubik-Huch⁴, Simone Muenst⁵, Noemi Schmidt⁶, Cecily Quinn⁷, Sorcha McNally⁸, Paul J van Diest⁹, Ritse M Mann^{10, 11}, Zsuzsanna Bago-Horvath¹², Maria Bernathova¹³, Peter Regitnig¹⁴, Michael Fuchsjäger¹⁵, Daniela Schwegler-Guggemos¹⁶, Martina Maranta¹⁷, Sabine Zehbe¹⁸, Christoph Tausch¹⁹, Uwe GÜth¹⁹, Eva Maria Fallenberg²⁰, Simone Schradíng²¹, Ashutosh Kothari²², Martin Sonnenschein²³, Gert Kampmann²⁴, Janina Kulka²⁵, Jean-Christophe Tille²⁶, Meike Körner²⁷, Thomas Decker²⁸, Sigurd F Lax²⁹, Martin Daniaux³⁰, Vesna Bjelic-Radisic^{31, 32}, Stephanie Kacerovsky-Strobl³³, Rosaria Condorelli³⁴, Michael Gnant³⁵, Zsuzsanna Varga³⁶

Paciente femenina de 49 años consulta por masa palpable periareolar mama izquierda. US diagnóstico: nódulo oval, márgenes microlobulados ecoestructura compleja con áreas quísticas internas (A) y dos nódulos ovals de márgenes microlobulados adyacentes (B y C). RM con cte ev muestra un realce tipo masa de márgenes no circunscritos (D, corte axial) y otros realces masas adyacentes (flechas) (E, reconstrucción coronal MIP). AP de PP: papilomas sin atipia.

Paciente de 65 años con masa palpable en CSE de mama derecha y diagnóstico de papilomas múltiples bilaterales en biopsia percutánea y carcinoma intraductal de grado intermedio y carcinoma lobulillar en biopsia radio quirúrgica.

A-B) Mamografía bilateral incidencias cc y mlo: Asimetría en cse de mama derecha.

C-D) Magnificación: nódulo oval de márgenes oscurecidos en cse de mama derecha y microcalcificaciones amorfas adyacentes.

E-F) Múltiples nódulos ovales de márgenes no circunscritos, en cse de mama derecha. Power doppler positivo.

G-H) Nódulos ovales de márgenes no circunscritos, en mama izquierda.

CONCLUSIONES

- La papilomatosis mamaria es una entidad poco frecuente que tiene una distribución periférica y múltiple y además se asocia a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
- La mamografía, ecografía y resonancia magnética muestran hallazgos imagenológicos de sospecha, por lo que el diagnóstico definitivo se realiza por biopsia percutánea.
- El tratamiento debe ser personalizado y consensuado dentro de un equipo multidisciplinario.

BIBLIOGRAFÍA

- Benjamin C Calhoun, Laura C Collins. Recommendations for excision following core needle biopsy of the breast: a contemporary evaluation of the literature. *Histopathology*. Jan 2016. 68: 138-151.
- Brookes MJ, Bourke AG. Radiological appearances of papillary breast lesions. *Clin Radiol* 2008; 63:1265–1273
- Cardenosa G, Eklund GW. Benign papillary neoplasms of the breast: mammographic findings. *Radiology* 1991; 181:751–755
- C. Saldarriaga Uribe, V. Martínez De Vega, S. Linares González, M. Recio Rodríguez | págs. 80-96
- Debnath, Debasish; Al-Okati, Dhafir; Ismail, Wael (2010). Multiple Papillomatosis of Breast and Patient's Choice of Treatment. *Pathology Research International*, 2010(), 1–4. doi:10.4061/2010/540590
- Eiada, Riham; Chong, Jennifer; Kulkarni, Supriya; Goldberg, Frank; Muradali, Derek (2012). Papillary Lesions of the Breast: MRI, Ultrasound, and Mammographic Appearances. *American Journal of Roentgenology*, 198(2), 264–271. doi:10.2214/AJR.11.7922
- Eiada, R., Chong, J., Kulkarni, S., Goldberg, F., & Muradali, D. (2012). Papillary Lesions of the Breast: MRI, Ultrasound, and Mammographic Appearances. *American Journal of Roentgenology*, 198(2), 264–271. doi:10.2214/ajr.11.7922
- I. Barco, A. García Fernández, M. Piqueras, A. Reñé, X. Rodríguez, A. Salas, A. Pessarrodona Servicio de Ginecología y Obstetricia. *REVISTA SENOLOGÍA PATOLOGÍA MAMARIA* 2010; 23 (5), PP. 214-217
- Mulligan AM, O'Malley FP. Papillary lesions of the breast: a review. *Adv Anat Pathol* 2007; 14:108–119
- Muttarak, Malai; Lerttumnongtum, Pailin; Chaiwun, Benjaporn; Peh, Wilfred C. G. (2008). Spectrum of Papillary Lesions of the Breast: Clinical, Imaging, and Pathologic Correlation. *American Journal of Roentgenology*, 191(3), 700–707. doi:10.2214/AJR.07.3483