REPORTE DE CASO

“COMPLICACIÓN DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA EN PACIENTE EMBARAZADA”

Autores:

- del Cerro, Agustina
- Santini, Magali
- Stur, Mariela
- Fattal Jaef, Virginia

Rosario, Santa fe, Argentina.

Contacto: agusdelcerro@gmail.com

*Los autores declaramos no presentar
conflicto de intereses*

- Concorre al servicio de guardia, una paciente femenina de 36 años de edad por un cuadro de dolor abdominal epigástrico, sin irradiación, de tipo continuo, asociado a náuseas de 24 horas de evolución.
- Niega antecedentes de jerarquía.
- Al interrogatorio dirigido, refiere estar cursando embarazo de 18 semanas de EG, gestas 1, partos 0.
- Se solicita laboratorio el cual no evidencia hallazgos positivos y ecografía abdominal que informa derrame pleural izquierdo.

Se solicita radiografía de torax frente con protección abdominal, para caracterizar el derrame pleural visto por ecografía.

Dado los hallazgos se decide realizar una RMI de torax, que informa una solución de continuidad de la porción posterolateral de la cúpula diafragmática izquierda, con una brecha de 9 cm. A través de dicho defecto se observa una hernia con contenido abdominal, que asciende al hemitórax izquierdo, conformada por estómago, bazo, cola pancreática y asas intestinales. El estómago se encuentra distendido, alcanza el ápice torácico mide 32 cm x 16 cm x 11 cm.

Las hernias diafragmáticas congénitas son un hallazgo poco frecuente, siendo aun menor el número de personas que llegan a la edad adulta de forma asintomática y sin diagnóstico.

Dada la baja frecuencia de dicha patología, el número de embarazos que se complican debido a esto es muy bajo. Se estima que el aumento de la presión intraabdominal ocasionado por el embarazo, incrementa la presión sobre el diafragma y genera dichos síntomas abdominales, lo cual agregado a los vómitos del primer trimestre y a un útero en rápido crecimiento, puede ocasionar manifestaciones clínicas.

Dado que nuestra paciente desconocía su condición, es importante contar con estudios de diagnóstico por imágenes para arribar al diagnóstico.

Teniendo en cuenta que un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno disminuye la mortalidad, y mejora la supervivencia.

En nuestro caso utilizamos RX con protección y RM de tórax para el diagnóstico.

La paciente cursó favorablemente su embarazo hasta las 38.4 semanas, fecha en la cual se decidió realizar una cesárea en forma programada, teniendo el binomio buena evolución.

1. <https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/8571/7037>
2. <https://radiopaedia.org/articles/diaphragmatic-hernia>
3. <https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.324115155>
4. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322008000400010
5. <https://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-valoracion-radiologica-hernia-diafragmatica-congenita-S0033833813000064>
6. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4088093/>