0383

PRESENTACIÓN ATÍPICA DEL SÍNDROME DE TERSON

Cayo Pary Jaime Nicolas; Iocco Grisel Agostina; Baliño Facundo Ariel; Cena Karen Milagros; Villalba Lettieri Mercedes; De Majo Marina Soledad.

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CUENCA ALTA NÉSTOR KIRCHNER
Cañuelas, Buenos Aires
bio.dx.rad@gmail.com
Los autores declaran no tener conflicto de interés.

+HCANK

0383

PRESENTACIÓN DE CASO:

Paciente de sexo femenino, de 53 años, con antecedente de hipertensión arterial no controlada, presenta deterioro del sensorio, sin signos de foco motor agudo, ni meníngeos, que con el correr de las horas presenta mayor deterioro.

Examen físico: Glasgow 12/15 (O1, V5, M6), hipertensa 200/120mmhg TAM: 163, ventilación espontanea.

Antecedentes: Hipertensión arterial no controlada, diabetes tipo II, hipotiroidismo, obesidad mórbida.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS:

0383





TOMOGRAFÍA: hematoma intraparenquimatoso talámico izquierdo asociado a volcado hemático en la totalidad del sistema ventricular y leve distorsión de la línea media.
Presencia de contenido espontáneamente hiperdenso en ambos globos oculares vinculable a hemorragia vítrea.

ECOGRAFÍA: se observa desprendimiento de vítreo posterior con hemorragia en espacio retro-hiloideo bilateral.

+HCANK

DISCUSIÓN:

El síndrome de Terson define como una hemorragia intraocular secundaria a una PIC elevada a causa de hemorragia intracraneana de forma aguda generalmente HSA (aneurismáticas o no aneurismáticas).

En esta paciente con antecedentes de HTA y diabetes, presenta un cuadro atípico quien sufre una hemorragia talámica con volcamiento ventricular. La hipertensión crónica y la diabetes aumentan el riesgo de hemorragia intracraneal y microvascular, resultando en un aumento abrupto de la PIC que puede causar hemorragias vítreas bilaterales, incluso sin hemorragia subaracnoidea. Este caso resalta la necesidad de considerar el síndrome de Terson en presentaciones inusuales, especialmente en pacientes con múltiples comorbilidades.

CONCLUSIÓN:

El presente caso de **síndrome de Terson** atípico, destaca la importancia de un enfoque diagnóstico integral. La ecografía ocular desempeña un papel crucial en la detección y evaluación de las hemorragias vítreas, confirmando el diagnóstico y facilitando la planificación del manejo clínico ya que puede ayudar a preservar la visión y evitar complicaciones.

Este caso subraya la necesidad de considerar presentaciones inusuales del síndrome de Terson y la **utilidad de la ecografía** ocular como herramienta diagnóstica en pacientes con hemorragia intracraneal compleja y compromiso visual.

”
”

0383

BIBLIOGRAFÍA:

- Síndrome de Terson; Rohit Sharma el 30 de marzo de 2024. https://radiopaedia.org/articles/terson-síndrome.

- Neurologia clinica y neurocirugia; Síndrome de Terson, conceptos actuales y estrategias de manejo: Rabii Aboulhosn, Bharat Raju, Fareed Jumah, Volumen 210, Noviembre 2021

- Terson syndrome: C E Swallow, J S Tsuruda, K B Digre, M J Glaser, H C Davidson and H R Harnsberger, of August 30, 2024. https://www.ajnr.org/content/ajnr/19/4/743.full.pdf

+HCANK