

1205

MASA MAMARIA PALPABLE EN PACIENTE MASCULINO

Camila GONZALEZ SAFAR, Maria Victoria YERMIR, Dolores GARCÍA
BARALE, Facundo Tomas ZUVIRIA, Luisina ROLLES, Lucrecia BALLARINO

Presentación sin conflicto de intereses





Presentación de caso


ANTECEDENTES PERSONALES:

- Masculino
- 66 años


ANTECEDENTES ENFERMEDAD ACTUAL:

- Masa palpable retroareolar izquierda
- 2 meses de evolución
- Sin otra sintomatología asociada


Hallazgos imagenológicos



Ecografía: nódulo retroareolar hipoecoico con bordes microlobulados, heterogéneo, y calcificaciones puntiformes, sospechoso de malignidad



Mamografía: nódulo irregular con distorsión del tejido, engrosamiento dérmico, retracción del pezón y calcificaciones puntiformes difusas



Resonancia con contraste: nódulo irregular y heterogéneo retroareolar izquierdo, con realce significativo y retracción e invasión del complejo areola-pezón. BI-RADS 6



Discusión

El **cáncer de mama masculino** es extremadamente raro, representa el 0,25% de los tumores malignos en hombres, y 0,5 - 1% de todos los cánceres de mama

Principales factores de riesgo: genéticos y antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario

Presentación más común: paciente entre 60-70 años, con masa subareolar unilateral, indolora, con cambios en la piel y/o pezón, secreción y dolor. Localización excéntrica de la masa, a diferencia de la ginecomastia que es central

No se realiza screening en hombres debido a su baja incidencia, por lo que el diagnóstico se hace en estadios más avanzados que en las mujeres

La mamografía y la ecografía son los métodos más sensibles y específicos para el diagnóstico, siendo ésta útil para guía de biopsia, la cual otorga el diagnóstico definitivo. *En el caso de nuestro paciente esta última describió carcinoma invasor (NST) tipo ductal.* La RM se utiliza para evaluar extensiones profundas

El tratamiento usualmente implica cirugía, seguida de adyuvancia con radioterapia, quimioterapia o terapia hormonal



Conclusión

A pesar de ser una condición poco común, el cáncer de mama en hombres demanda atención médica especializada para lograr un diagnóstico precoz y un tratamiento apropiado. Los especialistas en Diagnóstico por Imágenes juegan un papel crucial al seleccionar la prueba de imagen más adecuada en cada caso, discerniendo entre hallazgos sospechosos y benignos para minimizar exploraciones adicionales y procedimientos invasivos no justificados



Bibliografía

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0123901514000079>
- <https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/2087>
- <https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/8075>