N° 0416

SÍNDROME DE ZINNER

Autores: *Martínez, Dalma Emiliana. Garcia Fernandez, Micaela. Aguerre, Dario*

Email: dalmaemartinez@gmail.com

Afiliaciones: *SAR*

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 19 años, monorreno, consultó por dolor lumbar, disuria y urgencia miccional

Se le solicitó ecografía renal y TC de abdomen y pelvis con contraste

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

Agenesia renal izquierda.
En relación a pared posterolateral izquierda de la vejiga se reconoce imagen focal anecoica.



Italiano
HOSPITAL ITALIANO LA PLATA

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS



Agenesia renal izquierda asociado a quiste en topografía de la glándula seminal izquierda, generando protrusión e impronta sobre la pared posterior vesical.

Diagnóstico: Síndrome de Zinner

DISCUSIÓN

El síndrome de Zinner es una rara entidad urológica caracterizada por la dilatación quística unilateral de una vesícula seminal junto con atrofia o agenesia renal ipsilateral.

Los pacientes permanecen asintomáticos en la mayoría de los casos y su diagnóstico es incidental entre la segunda y tercera década de la vida, durante el período de mayor actividad sexual y reproductiva.

Se caracteriza por la presencia de quistes en las vesículas seminales y obstrucción del conducto eyaculador, y se asocia a otras anomalías genitourinarias, como agenesia renal ipsilateral en la mayoría de los casos y duplicidad del sistema colector.

CONCLUSIÓN

Consideramos a este síndrome como una entidad probablemente infradiagnosticada en pacientes masculinos con dolor pélvico, debido a que al tratarse de anomalías del desarrollo del sistema genitourinario, a menudo no son consideradas entre los diagnósticos diferenciales.

BIBLIOGRAFÍA

Zinner syndrome: special single kidney patients, Golda Alexandra Córdoba-Quishpe, Rev Clin Med Fam vol.14 no.2 Barcelona jun. 2021 Epub 26-Jul-2021