

VENA DE GIACOMINI. LA IMPORTANCIA DE SU CORRECTA EVALUACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RECIDIVAS Y COMPLICACIONES POST TRATAMIENTO.

AUTORES: Abait, María Luján
de Sola Ramos, Cesar
Mon Guillermo
Divita Anabel



CENTRO DIAGNÓSTICO MON
La Plata, Buenos Aires

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

EVALUAR VARIACIONES Y RELACIONES ANATÓMICAS ASOCIADAS A VENAS REGIONALES QUE PRESENTA LA VENA DE GIACOMINI DURANTE SU EXPLORACION CON EDC, DEBIDO A LA IMPORTANCIA EN LA PREVENCIÓN DE RECIDIVAS Y COMPLICACIONES VARICOSAS.

REVISION DEL TEMA


LA VENA DE GIACOMINI ES UNA VENA COMUNICANTE ENTRE AMBAS VENAS SAFENAS.

TOMA SU ORIGEN EN EL TRONCO DE LA VENA SAFENA EXTERNA O EN SU EXTENSIÓN CRANEAL EN UN 30%, DIRIGIÉNDOSE SUPERFICIAL AL TERRITORIO DE AMBAS VENAS SAFENAS POR CARA POSTERIOR DEL MUSLO Y CONTANDO CON DOS PROBABLES DESEMBOCADURAS, LA MÁS FRECUENTE EN NUESTRA EXPERIENCIA, DISTAL A LA VÁLVULA PRETERMINAL DEL CAYADO SAFENO FEMORAL EN FORMA DIRECTA O TRAVÉS DE LA VENA CIRCUNFLEJA POSTERIOR Y LA RESTANTE ES EN LA VENA ACCESORIA POSTERIOR DEL MUSLO.

EN SU DESCRIPCIÓN SE DEBERÁ CONSIGNAR CALIBRE, DILATACIONES , PRESENCIA DE REFLUJO, MENCIONANDO ALTURA DE ORIGEN A TRAVES DE UN PUNTO ANATÓMICO Y SU EXTENSIÓN COMO LAS RELACIONES VENOSAS A TRAVÉS DE SU TRAYECTO.






Origen de V. Giacomini en VSE, próxima al cayado safenopopliteo





Desembocadura a nivel del cayado safenofemoral posterior al ostium


Origen de vena de Giacomini a partir de extensión craneal de VSE






Origen de vena de Giacomini a partir de extensión craneal de VSE





Desembocadura de vena de Giacomini a nivel de vena femoral



CONCLUSIÓN

EN EL USO DEL EDC CONSIDERAMOS INDISPENSABLE EL CONOCIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA VENA DE GIACOMINI, EN LAS VARIANTES DE SU ORIGEN Y DESEMBOCADURA, A FIN DE IMPEDIR COMPLICACIONES POSQUIRURGICAS Y RECIDIVAS VARICOSAS.