APENDICITIS AGUDA PERFORADA DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA POSTILEAL

Autores: Leusson M₁; Peñaranda J₂; Avila L₃; Herrera Y₄; Morante P₅; Callapa R₆.

- 1 RESIDENTE, SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, HOSPITAL HIGA EVITA DE LANUS
- 2 RESIDENTE, SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, HOSPITAL HIGA EVITA DE LANUS
- 3 RESIDENTE, SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, HOSPITAL HIGA EVITA DE LANUS
- 4 RESIDENTE, SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, HOSPITAL HIGA EVITA DE LANUS
- 5 RESIDENTE, SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, HOSPITAL HIGA EVITA DE LANUS.
6. RESIDENTE, SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, HOSPITAL HIGA EVITA DE LANUS.

LOS AUTORES DEL TRABAJO, DECLARAN NO TENER NINGÚN CONFLICTO DE INTERÉS
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - MAIRITA-L06@HOTMAIL.COM

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de un paciente de 25 años de edad sin antecedentes patológicos conocidos, quien ingresa por guardia con cuadro clínico de dos días de evolución de dolor abdominal tipo cólico el cual se localiza en mesogastrio, asociado a náuseas y vómito, es valorado por cirugía general quienes no encuentran al examen físico signos de irritación peritoneal y en la ecografía reportan litiasis vesicular sin signos inflamatorios, por lo cual es dado de alta.

24 horas más tarde intercorre con dolor abdominal generalizado, con una intensidad de 9/10, se presenta a la guardia donde al examen físico presenta dolor a la palpación en el punto de Mc Burney y Blumberg (+), se solicitan nuevos exámenes de laboratorio donde se evidencia leucocitosis de 18.000 y uroanálisis no patológico. Se solicita TC de abdomen y pelvis con contraste oral.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

Figura 1 TC de abdomen y pelvis con contraste oral, corte sagital y coronal. Se observa incremento del calibre y la longitud del apéndice cecal, con un DAP de 10 mm y se ubica a nivel de la línea media abdominal de disposición Postileal (flecha naranja), con imagen hiperdensa de aspecto cálcico en su base, en relación a apendicolitos (flecha morada).

Figura 2 TC de abdomen y pelvis con contraste oral, corte axial. Se observa solución de continuidad de la pared del apéndice cecal, con pequeñas burbujas aéreas de proyección extraluminal (flecha azul) y presencia de líquido libre regional a predominio de la región cecal (flecha verde). Se evidencian signos de pancreatitis mesentérica colónica asociada (flecha morada). Hallazgos en relación a apendicitis perforada postileal.

DISCUSIÓN

El apéndice vermiforme se considera el órgano más variable del cuerpo humano. Identificamos habitualmente la base del apéndice en el aspecto posteromedial del ciego, a unos 2 cm de la válvula ileocecal.

Sin embargo la punta puede presentar variaciones en su localización debido a su longitud variable, su movilidad y de acuerdo a la posición del ciego.

En individuos con el apéndice de localización atípica, los síntomas en caso de apendicitis pueden llevar a un diagnóstico erróneo (colecistitis, diverticulitis, patología ginecológica), etc.

Es importante además tener presente que los "signos peritoneales" pueden no estar presentes o ser tardíos cuando la localización del apéndice no contacta con el peritoneo parietal, como en este caso, cuya localización es postileal.

CONCLUSIÓN

La apendicitis aguda es una patología frecuente, en la que las pruebas de imagen juegan un papel muy importante.

Sin embargo existen numerosas circunstancias que pueden condicionar una presentación clínica o hallazgos imagenológicos atípicos que debemos tener en cuenta para optimizar el manejo diagnóstico y terapéutico.

Debemos conocer que hay múltiples variantes en la localización del apéndice cecal, así como alteraciones anatómicas del tubo digestivo por las que el apéndice se localiza en regiones abdominales distintas de la FID.

BIBLIOGRAFÍA

- Zacharzewska-Gondek, A, Szczurowska A, Guzinski M, Sasiadek M, Bladowska J. A pictorial essay of the most atypical variants of the vermiform appendix position in computed tomography with their possible clinical implications. Polish journal of radiology.2019; 84: e1-e8. DOI:10.5114/pjr.2018.81158 5.
- Van den Worm L, Georgiou E, De Klerk M. C-reactive protein as a predictor of severity of appendicitis. S Afr J Surg. 2017;55(2):14-17. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28876618/>
- Yu YR, Shah SR. Can the diagnosis of Appendicitis Be Made Without a Computed Tomography Scan?. Adv Surg. 2017;51(1):11-28. DOI:10.1016/j.yasu.2017.03.002
- Wagner M, Tubre DJ, Asensio JA. Evolution and Current Trends in the Management of Acute Appendicitis. Surg Clin North Am. 2018;98(5):1005-1023. DOI:10.1016/j.suc.2018.05.006