N°: 344

QUISTE DE DUPLICACIÓN INTESTINAL: UN HALLAZGO INFRECUENTE

SPIEGEL, MARIA FERNANDA
MENDOZA,ARGENTINA
Contacto:mferspiegel@gmail

HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA

PRESENTACION DEL CASO

PACIENTE:

- Sexo femenino
- Prematuro
- Asintomático

EXAMEN FÍSICO:

Masa palpable en hipogastrio.

ESTUDIO SOLICITADO:

Ecografía abdominal y ginecológica.



En proyección a FID se visualiza imagen quística, con doble pared y contenido anecóico, evidenciándose claro plano de separación con respecto anexo derecho.

LAS DUPLICACIONES INTESTINALES SON ANOMALÍAS CONGÉNITAS, LOCALIZÁNDOSE HABITUALMENTE EN ÍLEON TERMINAL Y DUODENO.

EN NEONATOS TIENE DOS FORMAS DE PRESENTACIÓN: ASINTOMÁTICA O PRESENTANDO SÍNTOMAS INESPECÍFICOS, CON MASA PALPABLE, DISTENSIÓN Y DOLOR ABDOMINAL.

EL MÉTODO DE ESTUDIO INICIAL ES LA ECOGRAFÍA.
SIENDO CARACTERÍSTICOS EL SIGNO DE LA "DOBLE PARED" Y COMPRESIÓN DEL QUISTE.

EL DIAGNÓSTICO SE REALIZA INTRAÚTERO POR ECOGRAFÍA O RM FETAL

CONCLUSIÓN

SE PLANTEA QUE AUNQUE SEA UNA PATOLOGIA POCO FRECUENTE Y DE SINTOMAS INESPECÍFICOS, EL DIAGNOSTIO PRECOZ ES DE IMPORTANCIA PARA EVITAR COMPLICACIONES COMO SANGRADO, OBSTRUCCION O INFECCIONES.

BIBLIOGRAFIA

Quiste de duplicación enteral en paciente pediátrico: origen duodenal. 4 de noviembre de 2022, https://serau.org/2022/11/quiste-de-duplicacin-enteral-en-paciente-peditrico-origen-duodenall/.

Nebot, Cinta Sangüesa, et al. «QUISTES DE DUPLICACIÓN ENTÉRICOS :: presentación, diagnóstico y manejo». Seram , noviembre de 2018. www.piper.espacio-seram.com , https://www.piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/3035.