Nº: 966

PERCRETISMO PLACENTARIO EN EL CONTEXTO DE UNA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

Autores: Leuful Piano, María Luz; Barceló, Gabriel Hernán; Delieutraz, Gisele.

Bahía Blanca, Buenos Aires.

Email: mluzleuful@gmail.com

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de 24 años, G2C1A0, que consulta para solicitar interrupción legal del embarazo. Se realiza ecografía obstetrica transabdominal para datar edad gestacional.

Feto único de 19,6 semanas con cantidad de líquido amniótico habitual y **placenta previa oclusiva total y anterior; heterogénea, que se extiende a miometrio y protruye a pared vesical, presentaba aumento de la vascularización con Doppler color.** Sin poder confirmar por este método su afectación, por lo que se sugiere completar evaluación con RM de placenta.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

RMN: Placenta previa oclusiva total con bandas hipointensas en T2, marcada heterogeneidad para la EG, con signos de abultamiento hacia pared vesical y adelgazamiento miometrial. No se aprecia tejido placentario atravesando francamente la serosa, no obstante, discurren vasos sanguíneos en íntimo contacto con la misma.

Anatomía patológica: vellosidades coriales que penetran en las capas del miometrio sin decidua interpuesta. Asociado a leucocitos PMN entre las fibras musculares lisas y áreas de necrosis coagulativa: **percretismo placentario**.

DISCUSIÓN

El espectro de acretismo placentario es la implantación anómala de vellosidades coriónicas de la placenta adhiriéndose al miometrio. Factores de riesgo: placenta previa y cirugías uterinas previas. Asociado a aumento significativo de la morbilidad materna.

Según la profundidad de la invasión: acreta, las vellosidades se adhieren al miometrio; inacreta, invaden profundamente el miometrio; peracreta, penetran a través del miometrio y pueden invadir órganos adyacentes.

El **US** es el primer método utilizado para el diagnóstico. Sus características son: *Pérdida del plano hipocóico en el miometrio debajo del lecho placentario. *Presencia de múltiples lagunas placentarias. *Pérdida de la línea hiperecótica que separa la pared vesical del útero. *Adelgazamiento del miometrio a $<1\text{mm}$. *Abultamiento de la placenta hacia los órganos adyacentes. *Doppler color aumentado en la interfaz entre la placenta y el miometrio. Alcanza S del 90% y E del 96% con VPP:68% y VPN:98%.

RM: en T2, la placenta es hiperintensa y puede ser heterogénea. Evalúa el adelgazamiento focal del miometrio y la interrupción de la zona de unión.

Ambos métodos permiten reducir el riesgo de complicaciones maternas, facilitando la planificación del tratamiento para manejar la condición de forma segura y efectiva.

Según el grado de acretismo el tratamiento puede ser conservador con preservación del útero o no conservador mediante histerectomía con posible resección de órganos adyacentes si hay percretismo.

CONCLUSIÓN

La paciente presentaba antecedentes de cesárea y placenta previa oclusiva y anterior, como factores de riesgo. Los hallazgos ecográficos fueron S y E para el diagnóstico. La detección oportuna permitió programar el ILE sin complicaciones: histerectomía exitosa.

BIBLIOGRAFÍA

- Anomalías placentarias: placenta previa, placenta accreta y vasa previa. Clínic Barcelona.
- SERAM. Valoración mediante RM del acretismo placentario.
- SERAM 2014 / S-0873. Acretismos placentarios en RM. Descripción de la semiología radiológica, indicaciones y protocolos de actuación.