0918

¿SOSPECHO RECURRENCIA?

URBANAVICIUS MS, GIL PK, VEIGA NG.

Neuquén, Argentina

msurbanavicius@hotmail.com

Clínica Conciencia, Unidad Mamaria.

Las autoras declaran no tener conflicto de interés.

OBJETIVO

Mostrar los principales hallazgos
imagenológicos en la recurrencia del
cáncer de mama (CM).

REVISIÓN

La **recurrencia** del CM se define como la aparición de un **nuevo tumor local**, regional o distante **después de un año** del tratamiento inicial.

TIPOS DE RECURRENCIA

- ✦ Local: cicatriz o nueva lesión a **menos de 2 cm** de la original.
- ✦ Regional: **ganglios** linfáticos axilares y supraclaviculares.
- ✦ A distancia: pared torácica, piel, órganos **alejados** de la mama.

EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia acumulada a 5 años: 2,1%, mayor en mujeres jóvenes.

Disminuye después de 5-6 años, y a los 10 años es significativamente menor.

Rara antes de 2 años post-tratamiento.

Factores de riesgo: compromiso ganglionar, tumor >2 cm, edad ≤ 40 años.

BIOLOGÍA TUMORAL

HER2+ y triple negativos tienen recurrencias más tempranas..

Luminal B: más tendencia a metástasis locales.

IMÁGENES

UNIDAD
MAMARIA

HALLAZGOS MAMOGRÁFICOS

Asimetría

Nódulos

Microcalcificaciones

Engrosamiento cutáneo

Distorsión

**ASIMETRÍA FOCAL NUEVA
en CSE de MI, SOBRE
CICATRIZ**

**En US: NÓDULO IRREGULAR, en H12 de MI
En MX: DISTORSIÓN LEJOS de CICATRIZ**

HALLAZGOS EN US

Nódulos
Imágenes no masa
Engrosamiento cutáneo
Distorsiones

Valoración de
adenopatías
US mejor que RM!

HALLAZGOS EN RM

Realce de tipo masa o no masa, de acuerdo con la **biología** tumoral.

Se recomienda un estudio **dinámico** completo, por la importancia del **realce tardío** y las secuencias de **difusión**.

Considerar **falsos positivos**, como la necrosis grasa.

Mejor método para evaluar la pared torácica!

En 2008 NÓDULO
HORA 3 MD, CA.
TRIPLE -

En 2024, REALCE
NODULAR HORA
6 MD

RECIDIVA en MÚSCULO
PECTORAL

T1 FAT SAT
FASE TEMPRANA MIN 2

T1 FAT SAT
FASE TARDÍA MIN 8

UNIDAD
MAMARIA

T1 FAT SAT
DINÁMICO
FASE
TEMPRANA

CORONAL
DINÁMICO T1
FAT SAT
FASE TARDÍA

DIFUSIÓN

T2

UNIDAD
MAMARIA

***HALLAZGOS EN
PET/TC***

Hipercaptación metabólica y/o alteración morfológica en TC de nódulos y ganglios.

**RECIDIVA en SITIO QUIRÚRGICO,
10 AÑOS DESPUÉS del
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO.**

AXIAL T1 MIN 4

SUSTRACCIÓN

UNIDAD
MAMARIA

SOSPECHA CLÍNICA de RECAÍDA
CAMBIOS en la COLORACIÓN de la PIEL
NÓDULOS CUTÁNEOS

En US:
NÓDULO de
márgenes
IRREGULARES en
SITIO QUIRÚRGICO.

2021

En Mx:
RECAÍDA en MI con
COMPROMISO de
PEZÓN.
NUEVO TUMOR en
MD.

2024

CONCLUSIONES

La RM muestra elevada **sensibilidad** (90–100%) y especificidad (83–93%) para distinguir entre cicatriz postquirúrgica y recidiva tumoral, con elevado VPN (cercano al 100%).

El rol del **US** como método más eficaz en la valoración de **adenopatías** y el reconocimiento de los diferentes niveles ganglionares.

La **adecuada elección** del método diagnóstico de acuerdo con los hallazgos imagenológicos es crucial para mejorar el seguimiento de estas pacientes, lo que impacta positivamente en la **sobrevida** global.

BIBLIOGRAFÍA

- **1. Shinn-Huey S, Justin R, Constance D, et al. Preoperative Breast MRI for Newly Diagnosed Ductal Carcinoma in Situ: Imaging Features and Performance in Multicenter Setting (ECOG-ACRIN E4112 Trial), 2021. Radiology 2021; 301(1): 66-77. doi: [10.1148/radiol.2021204743](https://doi.org/10.1148/radiol.2021204743)**
- 2. Sang W, Won K, Doo H, et al. What Is High-risk Breast Cancer With Pathologically Negative Lymph Nodes for Regional Recurrence?, 2021. Clinical Investigation 2021; 111 (4):992-998. <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2021.07.005>
- 3. Conny V, Samson Y, Lotte M, et al. The impact of isolated local recurrence on long-term outcome in early-breast cancer patients after breast-conserving therapy, 2021. European Journal of Cancer 2021;155 28-37. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.06.018>
- 4. Vasily G, David W, Steven A. The risk of contralateral breast cancer: a SEER-based analysis, 2021. British Journal of Cancer 2021; 125(4): 601–610. doi: [10.1038/s41416-021-01417-7](https://doi.org/10.1038/s41416-021-01417-7)
- 5. Marara N, Buccimazza I, Ntombizakhona B, et al. Outcomes of breast conserving therapy: Recurrence, imaging findings and histological correlation, 2023. South African Journal of Radiology, 2023; 27 (1). <https://doi.org/10.4102/sajr.v27i1.2592>
- 6. Ghirardo L, Elizalde R, Newman M, 2012. Factores Asociados a Recidiva en Tratamiento Conservador del Cáncer de Mama Invasivo, 2012. Revista Argentina de Mastología 2012; 31(111): 147-158