CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA (ISOMERISMO IZQUIERDO)

AUTORES: Gonzales Oropeza, C, Tupia Uzategui, P , Lioni Maria ,E,
,CADI 2024,Bs. As., Argentina.

IMAT - Instituto Médico de Alta Tecnología -

Institución afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires

Viamonte 1742 - Buenos Aires, Argentina (5411) 4370-7600

www.imat.com.ar

Los autores declaran no tener conflictos de interés en esta presentación

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Definir e interpretar las diferentes variantes anatómicas halladas en el situs ambiguus poliesplénico , con la finalidad de realizar un diagnóstico radiológico idóneo y completo.

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

REVISIÓN DE TEMA:

- ❑ La heterotaxia es una anomalía poco frecuente, que se caracteriza por presentar una alteración en la organización habitual de los órganos respecto al situs solitus.
- ❑ Puede ser de dos tipos: asplenica y poliesplenica (más frecuente) o también llamado como isomerismo izquierdo. En esta estudio se abarcara el segundo tipo mencionado.

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

- ❑ Siendo más frecuente en mujeres y poco habitual en la edad adulta, las manifestaciones que presenta el situs ambiguus son las siguientes:
- ❑ Cardiacas; se presenta con atrios izquierdos bilaterales, además de un hallazgo característico en este tipo de isomerismo, es una vena cava inferior interrumpida que se da en el 80% de los pacientes, que llega a drenar en la vena ácigos y posteriormente al atrio a través de la vena cava superior.
- ❑ Cabe hacer mención que en la heterotaxia asplénica, hay pocos datos de hallazgos a nivel cardíaco por la razón de la alta mortalidad que presenta la patología.

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

- ❑ Se halla la vena cava inferior izquierda, persistencia de la vena cava superior
- ❑ (VCS) izquierda y VCS bilateral. Ausencia de la vena esplénica y un segmento intrahepático corto de la VCI.

- TAC DE ABDOMEN CORTE AXIAL ;SE OBSERVA CONTINUACION DE LA VENA AZYGOZ DE LA VENA CAVA INFERIOR

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

- ❑ A nivel pulmonar podemos hallar en el isomerismo izquierdo , pulmones bilobulados simétricos, con bronquios en situación hipoarterial; es decir discurren inferior a las arterias pulmonares y tiene el recorrido más largo.

TAC DE TÓRAX; CORTE SAGITAL, SE OBSERVA PULMÓN DERECHO BILOBAR

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

- ❑ La poliesplenía se encuentra en la mayoría de los pacientes , su numero puede ir de 1 a 10 , media de 6 , de múltiples tamaños. El bazo o los bazos se suelen localizar en el mismo lado que se encuentra el estómago, típicamente a lo largo de la curvatura mayor

TAC DE ABDOMEN CON CONTRASTE ORAL, CORTE AXIAL. SE VISUALIZA POLIESPLENIA.

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

TAC DE ABDOMEN ;CORTE CORONAL, SE OBSERVA POLIESPLENIA

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

- ❑ En un 50% el hígado tiene una presentación central, aunque también puede estar en el lado derecho o izquierdo del abdomen. En los adultos es común la presencia de la triplicación de los conductos biliares.
- ❑ Respecto al páncreas , el hallazgo común que se evidencia es el páncreas truncado o incompleto es decir que tiene cabeza normal pero ausencia de cuerpo y cola, o también un páncreas anular.

TC DE ABDOMEN CORTE AXIAL DONDE SE EVIDENCIA PÁNCREAS TRUNCO O CORTO.

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

- ❑ El estómago se puede hallar tanto a la derecha como a la izquierda. Como una variante frecuente a nivel intestinal ,se encuentra la malrotación,el intestino delgado derecho y colon izquierdo.
- ❑ No existe ninguna alteración patognomónica , siendo el conjunto de todas estas anomalías lo que dirigen el diagnóstico.

TAC DE ABDOMEN CORTE AXIAL , DONDE SE EVIDENCIA HÍGADO EN LÍNEA MEDIA ABDOMINAL.

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

CONCLUSIONES:

- ❑ La heterotaxia al ser grupo de patología poco frecuente y que además ninguno de los hallazgos mencionados son patognomónicos de la patología, se torna un reto para el médico radiólogo dirigir el informe hacia un diagnóstico eficaz y oportuno. Lo que nos obliga a observar de forma minuciosa cada órgano buscando y descartando posibles complicaciones. Así como también la importancia de reconocer cada uno de las variantes anatómicas y describirlas siendo así de gran apoyo para los otros especialistas tratantes del paciente.

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS HALLADAS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA POLIESPLENICA

BIBLIOGRAFIA:

- 1) M. A. C. Udaondo, I. Jimenez Cuenca, L. CasadiegoMatarranz, N. AndresGarcia, P. Cartón Sánchez, R. Esteban Casado; Valladolid/ES
PATOLOGIA ESPLENICA INFRECUENTE .ESTUDIO CON TC MULTICORTE
- 2) Abreu A, Nieto-Morales ML, Fuentes M. Heterotaxy syndrome in a Young adult. J Clin Med. 2012;9(1):36-44.
- 3) A. Kayhan, H. Lakadamyali, J. Oommen, A. Oto.
Polysplenia syndrome accompanied with situs inversus totalis and annular pancreas in an elderly patient.