



LINFOMA NO HODGKIN PRIMARIO DE LA MAMA

Autores: Moreno M, Pantol C,
Parodi C, Romero R, Gonzalez B,
Mejia K, Echeverri A.





INTRODUCCIÓN

SE PRESENTA EL CASO DE UNA PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE LINFOMA NO HODGKIN PRIMARIO DE LA MAMA (LNHPM) Y SE REALIZA UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL ORIGEN DEL TUMOR, SU EPIDEMIOLOGÍA Y SUS CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS.

CASO CLINICO


- PACIENTE DE 57 AÑOS QUE CONSULTA POR UN NÓDULO PALPABLE EN EL CSE DE LA MAMA IZQUIERDA DE 2 MESES DE EVOLUCIÓN.
- ANTECEDENTES PERSONALES: AHT A LOS 45 AÑOS.
- ANTECEDENTES FAMILIARES: NO REFIERE
- G2P2
- LACTANCIA POSITIVA
- DADO LOS HALLAZGOS SE EFECTUÓ CORE BIOPSIA BAJO GUÍA ECOGRÁFICA CUYO DIAGNOSTICO FUE CONFIRMADO POSTERIORMENTE EN BIOPSIA QUIRÚRGICA.
- SE UTILIZO ECÓGRAFO GE, AGUJA DE 14 G CON PISTOLA AUTOMÁTICA HISTO.

HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS




Mx: Nódulo de forma irregular y márgenes indistintos de alta densidad en CSE de la mama izquierda.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS




Señalización con perdigón y posterior
concordancia radiológica.
Coincide con nódulo ecográfico.

HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS



Ecografía: Nódulo hiperecoico con centro hipoecoico que mide 17 x 8 mm



Doppler color positivo:
vascularización periférica

DISCUSION

- LOS LINFOMAS SON ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS DE CÉLULAS ACTIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA INMUNOLÓGICO. LNHPM SON MENOS DEL 1 % (0,04 % AL 0,53 %) DE LOS TUMORES MALIGNOS DE LA MAMA. SE CONSIDERAN EL 0,7 % DE LOS LNH EN GENERAL, Y EL 2 % ENTRE LOS LNH DE LOCALIZACIÓN ÚNICA EXTRAGANGLIONAR.
- LA DEFINICIÓN PARA SER CONSIDERADO UN LNHPM ES PRECISA: DEBE SER UNA LESIÓN NODULAR SIN ADENOPATÍAS (ESTADIO I) O CON ADENOPATÍAS REGIONALES (ESTADIO II), SIN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LNH.
- LA EDAD PROMEDIO DE PRESENTACIÓN ES DE 57 AÑOS Y ALREDEDOR DEL 33 % SE DIAGNOSTICAN EN LA SEXTA DÉCADA DE LA VIDA, GENERALMENTE SON UNILATERALES Y POCO AGRESIVOS, Y SU DISTRIBUCIÓN ETÁREA ES SEMEJANTE A LA DEL CARCINOMA MAMARIO.
- LOS HALLAZGOS MAMOGRÁFICOS SON VARIABLES, DESDE ASIMETRÍAS FOCALES, NÓDULOS DE MÁRGENES CIRCUNSCRIPTOS A IMÁGENES NODULARES CON MÁRGENES INDISTINTOS QUE LOS HACEN INDISTINGUIBLES DE UN PROCESO NEOPLÁSICO MALIGNO.

CONCLUSIONES

- EL LNHPM ES UNA ENTIDAD RARA.
- NO SE RECONOCEN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES MAMOGRÁFICAS O ULTRASONOGRAFÍAS QUE HAGAN SOSPECHAR UN LINFOMA PRIMARIO DE LA MAMA



MUCHAS GRACIAS

