

# FRACTURA DE TODDLER

## FRACTURA DE LOS PRIMEROS PASOS



CLÍNICA UNIVERSITARIA  
**REINA FABIOLA**  
*Fundación para el Progreso de la UCC*

Tirabasso, Lucas  
Muñoz Ferragut, María Florencia  
Pelizzari, Mario

# FRACTURA DE TODDLER

Fractura oblicua o espiralada, no desplazada, espiroidea, principalmente de la tibia, en niños menores a tres años

Es conocida como la

*fractura de los primeros pasos*

## Clínica:

Marcha claudicante, rechazo a la bipedestación, tumefacción e hipersensibilidad local

# FRACTURA DE TODDLER



La Rx puede revelar un trazo oblicuo llamado **“signo del cabello”**, el cual suele ser visible en una sola proyección radiológica ya sea AP o lateral

# FRACTURA DE TODDLER



“**Signo del cabello**”, visible principalmente en Rx de lateral

# FRACTURA DE TODDLER

- Es una ***fractura por stress***
- No es infrecuente que las Rx sean negativas inicialmente. Puede repetirse tras una o dos semanas de inmovilización y detectarse ***reacción perióstica sin trazo de fractura evidente***
- Sino puede realizarse TC o Gammagrafía

# FRACTURA DE TODDLER

- Otras localizaciones menos frecuentes: peroné, calcáneo, cuboides y astrágalo

***No incluye fracturas femorales en espiral, lo que debería hacer sospechar lesión no accidental***

# FRACTURA DE TODDLER

## Conclusión:

La historia clínica, la exploración física y la Rx ayudan a identificarla.

Es una patología que debe ser conocida por los médicos y requiere un alto índice de sospecha, a fin de evitar el retraso en el diagnóstico y tratamiento