

El valor de un exhaustivo análisis del mesenterio por TAC, para el diagnóstico del tumor carcinoide intestinal.

Centro Privado de Diagnóstico por Imágenes Arroyito, Córdoba.

Gómez Analía; Luraschi Matías

Introducción

- Los tumores carcinoides, son neoplasias neuroendocrinas que secretan serotonina (5-hidroxitriptamina). Pueden originarse en cualquier órgano, más frecuentemente broncopulmonar y gastrointestinal.
- Poseen grado variable de potencial maligno, con manifestaciones clínicas inespecíficas. Las pruebas de imagen constituyen soporte en la localización y estadificación, así como en el control del tratamiento.

- La localización más frecuente es en intestino delgado.
- Pueden acompañarse de metástasis ganglionares regionales y hepáticas al diagnóstico.
- La afectación mesentérica se visualiza como una masa de tejidos blandos, que puede acompañarse de focos cálcicos, ocasionando engrosamiento y aumento de la densidad del mesenterio.

Objetivos

- Fomentar la importancia en la revisión del mesenterio para el diagnóstico adecuado del tumor carcinoide intestinal.

Conclusión

- Los tumores carcinoides deben tenerse en cuenta al momento de la identificación de neoplasias gastrointestinales, respaldando sus características tomográficas, no olvidando la clínica del paciente para determinar un diagnóstico definitivo y un objetivo terapéutica.

